2.脂肪变性 和水样变性都只发生于细胞内

（1）脂肪变性指除脂肪细胞外、实质细胞中出现脂滴或脂滴明显增多，**空泡或苏丹III阳性**






图 1-10　肝细胞脂肪变
肝细胞胞质中见大小不等的空泡，为脂滴；部分细胞核偏向细胞的一侧。





压迫性萎缩 —长时间造成损伤→ 脂肪变性

肝血窦→中央V→小叶下V→肝V→下腔V→右心房

（2）好发部位

肝 脂类代谢场所 最常见	①慢性**右**心衰→慢性**肝淤血**→**槟榔肝** 瘀血(红色)导致缺氧,临近肝细胞发生脂肪变性 （肝小叶中央静脉及其周围肝血窦扩张呈暗红色、肝细胞发生脂肪变性呈黄色） 注意：肝淤血时脂肪变性**首先**发生在小叶**中央**、但脂肪变性集中在小叶周边 从外界来的毒素首先经过小叶间V最后才到中央 （VS 磷中毒时脂肪变性首先发生在小叶周边）越靠近中央区血供越差,中间肝细胞已经不是可逆性损伤,已经出现坏死,周边血供好,残存少量发生脂肪变性的肝细胞 ②病毒性肝炎尤其**丙肝**、**丁肝**（盯着饼干吃长胖） 如**慢性丙肝的脂肪变性、门管区淋巴滤泡、胆管损伤更多见** 饼干泡面管饱、长胖、损伤 ③**酒精肝：脂肪变性、玻璃样变性/Mallory 小体、灶状坏死、中性粒细胞浸润** （早种芝麻）
心	**虎斑心**（胖虎）：心肌细胞**内**的脂肪沉积，脂肪变性的黄色条纹与未受累心肌细胞的红色条纹相间排列，好发于**左**心室 与缺氧有关 做功多,需要能量多,容易发生缺氧 心肌纤维 脂肪沉积 心肌纤维 心肌细胞 注意：脂肪心（心肌脂肪浸润）指心肌纤维间脂肪沉积，心外膜增生的脂肪进入心肌间质，好发于心尖区和右心室 减肉 you，**不属于脂肪变性**
肾	**脂性肾病**：好发于**近**端小管上皮细胞 既可能发生近端小管上皮细胞的脂肪变性 也可能发生近端小管上皮细胞的玻璃样变性
骨骼肌	重吸收脂蛋白主要部位



3.**玻璃样变性/透明变性**

（1）细胞或间质中出现均质红染、半透明的玻璃样物质（蛋白质沉积）

（2）栗子