随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

①**纤维结缔组织（胶原蛋白沉积）**：各种坏死组织的**机化**、**瘢痕**组织、动脉粥样硬化**纤维斑块/纤维帽**、萎缩的子宫和乳腺间质

肉芽组织→瘢痕组织(胶原纤维↑)　SMC产生胶原纤维

风湿病 A.血管壁玻璃样变性× 只有两种情况

B.血管壁纤维素样坏死✓（风湿的纤维素样坏死既可发生在结缔组织,也可发生于血管壁-风湿性动脉炎）

C.结缔组织的玻璃样变性✓(梭形小瘢痕)

有纤维化的地方都有结缔组织的玻璃样变性

只记两个

②**血管壁（血浆蛋白沉积）**：**缓进型高血压**、**糖尿病**的细小动脉壁（**细小动脉硬化**）




图 1-11　脾中央动脉玻璃样变

原发性高血压时，脾中央动脉管壁增厚，管腔相对狭小，动脉壁内见红染、均质的玻璃样变物质。




图 9-14　高血压病肾小球入球动脉玻璃样变

肾入球动脉管壁增厚呈红染均质状，管腔狭窄。

③**细胞内**：只记三个

滤过屏障受损,尿中出现蛋白质

	细胞定位	重吸收 蓄积物质	意义
重吸收/**玻璃样小体**/滴	肾近端小管上皮细胞	血浆蛋白（与**溶酶体**融合）	**蛋白尿**
Mallory 小体	肝细胞 酒干吗	**中间丝前角蛋白**	**酒精肝**
Rusell 小体	浆细胞 乳浆	**粗面内质网免疫球蛋白** 抗体	**慢性炎症** 浆细胞活跃 **骨髓瘤**

①脂性肾病时近端小管上皮细胞既可发生玻璃样变性又可以发生脂肪变性

②乙肝毛玻璃样细胞-嗜酸性细颗粒物沉积(HBsAg)、光/滑面内质网增生 VS 粗面内质网存在核糖体 蛋白质合成场所

来自浆细胞的恶性肿瘤

4.淀粉样变性

沉积的蛋白质染色跟淀粉一样

①有淀粉样呈色特点：遇碘呈棕褐色、再加稀硫酸则呈蓝色，刚果红染色呈橘红色，在偏振光显微镜下呈苹果绿色

HL　淀粉小体

②栗子：霍奇金淋巴瘤、**骨髓瘤**、**阿尔兹海默病**、前列腺增生、限制型心肌病、**甲状腺髓样癌**（水一点）、**2 型糖尿病**、**结核**（hello 有骨髓瘤的海默在前线吃淀粉软糖治结核）

胰岛素抵抗→早期胰岛素↑淀粉样蛋白质↑

5.黏液样变性

①星芒状纤维细胞散在于黏液基质

代谢↓蛋白质合成↓黏液性蛋白质分解↓

②栗子：**甲减**（**黏液性水肿**）、**风湿病**、**葡萄胎**、粥样斑块、间叶组织肿瘤

（风到粥里就是粘、粘住间叶的葡萄）