小结：

类型	蓄积物质	病变部位
水样变性	Na^+、水	**细胞内**
脂肪变性	甘油三酯	**细胞内**
玻璃样/透明变性	蛋白质	细胞内、间质
淀粉样变性	淀粉样蛋白质和黏多糖	间质 dian
黏液样变性	黏多糖、蛋白质	间质 nian
病理性色素沉着	脂褐素、含铁血黄素、黑色素、胆色素	细胞内、间质
病理性钙化	磷酸钙、碳酸钙、氢氧化钙	细胞内、间质

只发生于细胞内

只发生于间质

天天师兄

三、坏死

（一）坏死的类型

1.凝固性坏死

①坏死组织与周围**分界清楚**，原有**组织轮廓保留**（如**梅毒**肉芽肿常伴凝固性坏死、镜下可见原有**血管壁轮廓**）

本身血管炎

组织结构致密

②好发部位：**心、肾、脾、肝、胰** 蛋白质含量丰富(蛋白质变性凝固)

复习：伤寒的蜡样变性指横纹肌发生凝固性坏死（蜡烛-凝固）





图 1-15　肾凝固性坏死

低倍镜下，凝固性坏死区肾小管、肾小球等肾组织结构轮廓尚可辨认，但肾小管上皮细胞和肾小球细胞微细结构消失。本图右上区可见炎症反应带和正常肾皮质结构。



2.液化性坏死

①可形成**囊腔**、**脓肿** e.g 细菌性肝脓肿

阿米巴脓肿为变质性炎，发生液化性坏死

②好发部位：

微小软化灶

脑	如**乙脑筛状软化灶、高血压、动脉粥样硬化→脑软化**
脊髓	
肝	如**病毒性肝炎溶解性坏死** 肝:既可以发生凝固性坏死,又可以发生液化性坏死

磷脂、水分丰富

有丰富的水解酶

病毒性肝炎:早期肝细胞水样变性→后期发展成为溶解性坏死