

3.干酪样坏死（彻底的凝固性坏死）

①多见于结核

②坏死灶含脂质较多，呈干燥、淡黄、细腻、质实、无结构的嗜酸性红染颗粒状物质

病毒性肝炎
- 脂肪变性 脂肪坏死❌
- 水样变性→液化性坏死
- 嗜酸性变→ 嗜酸性坏死（本质是凋亡）

4.脂肪坏死（特殊的液化性坏死）

钙皂导致低钙血症评估胰腺坏死程度

①酶解性脂肪坏死：多见于急性重型胰腺炎（钙皂）。注意胰腺本身为凝固性坏死 VS 胰周围脂肪组织液化性坏死

肝和胰腺都既会发生凝固性坏死也会发生液化性坏

②外伤性脂肪坏死：多见于女性乳房创伤

肠腔的脂肪酸与Ca2+形成钙皂→抓住Ca2+，利于Ca2+在肠道吸收

VS 急性重症/出血坏死性胰腺炎：脂肪坏死→脂肪酸与血液中的Ca2+形成钙皂→低钙血症

5.纤维素/纤维蛋白样坏死~~（旧称纤维素/纤维蛋白样变性）~~

抗原抗体复合物（说明涉及免疫）引发的胶原纤维肿胀消解

①结缔组织、小血管壁的胶原纤维坏死 跟纤维素染色相似

肉包皮蛋 月亮 又急又重（比较强的免疫反应）

②栗子：急进型高血压、风湿、类风湿、新月体性肾炎、重症急性肾炎、结节性多动脉炎、胃溃疡、SLE、超急性排斥反应、1型糖尿病、SARS/MERS/COVID-19

VS 缓进型高血压：细小A玻璃样变性

变态反应太重 跟免疫有关 引起ARDS（可出现纤维素样坏死）

（高风亮节、喂狼超糖） VS 2型糖尿病淀粉样变

注意：慢性肺心病（肺动脉高压）不会出现纤维素样坏死 是出现胶原纤维增生

6.坏疽

①大片组织坏死后继发腐败菌感染

②发生在与外界直接或间接相通的器官（液化性坏死：心、肾、脾、肝、胰、脑、脊髓等不发生坏疽）

凝固性坏死

③分类：均有动脉闭塞一坏死，区别在于静脉

	干性坏疽	湿性坏疽	气性坏疽 特殊的湿性坏疽
原因	动脉闭塞、静脉正常（水分带走）	动、静脉均闭塞（水分带不走）	湿性坏疽+厌氧菌（产气）
形态	干燥、皱缩呈黑褐色	湿、软、大、绿、臭	气泡、捻发音
好发	肢体末端	阑尾、子宫、肺、肠、胆囊 男子非常胆大	深部组织 开放性创伤
分界	清楚	不清	不清
病情	较轻	重	重