



图 1-16　足干性坏疽
干性坏疽累及脚趾，呈黑色，干枯，与周围组织边界清楚，为血栓闭塞性脉管炎引起的缺血性坏死，小趾已脱落缺失。

小结：器官的常见坏死类型

①**心、肾、脾、肝、胰：凝固性坏死**

②**脑、脊髓、肝、胰、乳房：液化性坏死** 脂肪坏死是特殊的液化性坏死

③**阑尾、子宫、肺、肠、胆囊：湿性坏疽**

④**肢体末端：干性坏疽**（注意：肢体末端也可发生湿性坏疽、但不是好发）
干性坏疽和湿性坏疽区别本质是静脉有无闭塞—静脉闭塞水分带不走


（二）坏死的结局


1.溶解吸收

2.分离排出

①糜烂和溃疡：皮肤、黏膜组织坏死经分离排出后，遗留的浅表缺损为糜烂、深达皮下及黏膜下层的缺损为溃疡

注意：溃疡多深达肌层，少数深达黏膜下层即**浅溃疡（菌痢、溃疡性结肠炎）**





②空洞：肺、肾等组织坏死经自然管道排出后遗留的缺损

③**窦道**：如**腰椎结核的脓液从背部病变处流出** 腰椎病变部位是盲端,只有皮肤一处开口