
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

外科造瘘/造口一造瘘管

④**瘘管**（两端相通吸管）：**如阑尾切除术后切口处有肠内容物流出**





长期胆囊结石→胆囊发炎→炎症穿破胆囊肠壁形成瘘管→胆结石经过瘘管进入肠道→较大的胆结石引起胆石性肠梗阻

3.**机化和包裹**：坏死组织若不能完全溶解吸收或分离排出，可被**肉芽组织**取代，如**脓肿壁**

肝脓肿做CT脓腔不强化(液化性坏死),脓肿壁强化(肉芽组织有丰富血管)-环形强化

4.**营养不良性钙化** 即将坏死的组织局部碱性磷酸酶↑→吸引钙离子沉积→局限住病灶

VS 转移性钙化:为省学费转学了

（三）坏死 VS 凋亡

细胞不断脱水

	坏死 他杀	**凋亡**~~（旧称固缩坏死）~~ 自杀；脱水
诱因	病理性刺激	①生理性刺激 ②**轻微病理性刺激：如病毒性肝炎肝细胞的嗜酸性坏死形成嗜酸性小体/Councilman body（属于凋亡小体）**
死亡范围	大片细胞群体	单个或小团细胞
机制	非基因调控的被动死亡 （不依赖 ATP、无新蛋白合成）	**基因调控的主动程序性死亡** （依赖 ATP、有新蛋白合成）
细胞核	核固缩、核碎裂、**核溶解**、核染色质边集 均有核缩核碎核边	核固缩、核碎裂、核染色质边集 说明核没有被溶解 （凋亡小体含核碎片和细胞器成分）
细胞质	红染或消散 ttsx	致密红染 细胞质出芽形成均质红染的凋亡小体
细胞膜 细胞器膜	**破裂** （细胞膜破坏是非基因调控损伤的关键环节）	**完整** **（形态学与坏死的明显区别）** 膜可发泡成芽形成凋亡小体 遗容保留
细胞自溶	有	**无**
炎症反应	有 膜内东西跑出去	**无**（无细胞内容物外溢）
生化特征	琼脂凝胶电泳多不呈梯状带	琼脂凝胶电泳呈**梯状带**（DNA 规律降解）
结局	**修复**	巨噬细胞或相邻实质细胞吞噬凋亡小体