随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

B.窦道
C.脓肿
D.溃疡

8.2016N43 A 凝固性坏死的形态学特点是
A.细胞膜、细胞器膜完整
B.病灶中出现炎症细胞
C.形成筛状软化灶
D.保持原有轮廓

9.2016N133-134 B
A.小动脉纤维化 慢性排斥反应
B.假膜性炎症
C.细动脉玻璃样变性 ①缓进型高血压②糖尿病
D.纤维蛋白样变性 纤维素样坏死
纤维素渗出后可形成的病变是 大叶性肺炎(肺泡的纤维素性炎)、细菌性痢疾(假膜性炎)
血管壁受到体液免疫攻击的急性期病变是
超极性排斥反应-急性小动脉炎:纤维素样坏死伴纤维素性血栓

10.2017N29 A 以下形态学改变中，属于凋亡特征的是
A.多是片状细胞死亡
B.细胞核固缩、碎裂 坏死中也可出现
C.常为炎症反应和修复再生
D.细胞膜完整，发泡成芽

11.2017N33 A 以下选项中，小血管壁纤维素样坏死常见的疾病是
A.急进性高血压 高风亮节,喂狼超糖
B.良性高血压
C.心肌病
D.肺动脉高压

12.2018N29 A 以下组织中，不会发生化生的是
A.肾盂黏膜上皮 VitA缺乏时,肾盂和膀胱移形上皮→鳞状上皮
B.宫颈柱状上皮 宫颈癌可以与化生有关,也可以没关
C.结缔组织 骨化性肌炎
D.神经纤维

发生在结缔组织和小血管壁的胶原纤维坏死,即细胞外
13.2018N30 A 以下组织中，不会发生纤维素样坏死的是
A.骨骼肌肌纤维 =肌细胞
B.心肌间质 风湿性心肌炎
C.肾小球 又急又重的新月体肾炎和重症急性肾炎
D.小动脉

答案：8-13 D BD D A D A