随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

②含铁血黄素：巨噬细胞的溶酶体分解 Hb（不要红细胞；淤血、出血、溶血）

正常情况见于肝、脾、淋巴结、骨髓
肺泡腔内的心衰细胞（含有含铁血黄素的巨噬细胞）：慢性左心衰致慢性肺淤血（肺褐色硬化）：肺静脉端毛细血管静水压和通透性↑、破裂→红细胞漏出至肺泡腔内
大叶性肺炎的铁锈色痰、陈旧性出血（如子宫内膜异位症致卵巢巧克力囊肿）
阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH 的含铁血黄素尿（尿 Rous 试验阳性）

B.黑色素

C.胆红素

D.含铁血黄素 分解血红蛋白

28.2023N30 A 容易发生机化的病变是

A.肺脓肿

B.脑梗死灶 不靠肉芽组织进行修复,靠胶质细胞进行增生修复(星形胶质细胞形成胶质纤维瘢痕)

C.Barrett 食管

D.宫颈管鳞状上皮化生

星巴小姐姐

对于大部分组织不完全修复必经之路都有肉芽组织

但对于脑组织,更多靠的是星形胶质细胞,在特别严重除损害脑实质还累及脑膜、脑血管的情况可能才会有肉芽组织参与

29.2024N29 A 下列选项中，最符合萎缩本质的是

A.细胞器减少

B.脂褐素~~减少~~ 增多

C.间质细胞减少 假性肥大-实质萎缩时,间质增生

D.自噬泡~~减少~~ 增多

30.2024N30 A 下列形态学改变中，符合心肌脂肪变性的是

A.心脏体积增大，外观为黄色

B.心肌细胞内出现串珠状脂滴

C.心肌细胞核受挤压偏位 印戒细胞癌也可出现

大疱性脂肪变

D.病变发生在心外膜下

31.2024N40 A 在下列化生中，不会发生的情况是

A.支气管纤毛柱状上皮细胞被鳞状上皮细胞取代

B.食管鳞状上皮细胞被肠上皮细胞取代

C.胃上皮细胞被大肠上皮细胞取代

D.肠腺上皮细胞被软骨细胞取代 化生发生在同源细胞间

32.2025N29 A 酒精性肝炎的肝细胞胞浆中可见 Mallory 小体，其组成成分是

A.变性的内质网

B.变性的线粒体

C.过氧化物酶体

D.中间丝前角蛋白

33.2025N32 A 凋亡细胞的形态特征是

A.细胞固缩，细胞膜完整，膜可发泡成芽，形成凋亡小体

B.细胞肿胀，细胞膜及细胞核溶解破坏，细胞自溶

C.细胞肿胀，细胞膜完整，细胞器膜溶解破坏，形成凋亡小体

D.细胞固缩，细胞器膜溶解消失，核碎裂，形成凋亡小体

34.2025N38 A 金黄色葡萄球菌感染性脓肿的坏死类型是

A.干酪样坏死

答案：28-34 A A B D D A D