小结：血栓都有纤维素/纤维蛋白、血细胞（红细胞/白细胞/血小板），但各自比例不同：

①白色血栓主要为血小板，肉眼呈灰白色小结节或赘生物状

镜下看红染,肉眼看透明

②混合血栓主要为血小板+网罗大量红细胞的纤维素，肉眼呈灰白色与红褐色层状交替

③红色血栓主要为网罗大量血细胞的纤维素（血细胞比例与血液相似、即红细胞为主），肉眼呈暗红色

长期卧床,血流缓慢,局部易凝血

④纤维素性血栓主要为纤维素，纤维蛋白肉眼透明，因此称为透明血栓

4.血栓的结局

好处　坏处　脱落

①软化、溶解和吸收：大血栓部分软化可致血栓栓塞

②**机化：肉芽组织取代血栓**

③再通：被阻塞的血管**部分**重建血流（再通不会恢复正常血流）局部软化,溶解吸收

④**营养不良性钙化：静脉石、动脉石**





图 3-8　血栓机化和再通
血栓机化，可见再通的血管。




## 三、栓塞





图 3-5　静脉内血栓形成示意图
A. 静脉瓣膜内血流形成漩涡，血小板沉积；B. 血小板继续沉积形成小梁，小梁周有白细胞黏附；C. 血小板梁间形成纤维蛋白网，网眼内充满红细胞；D. 血管腔阻塞，局部血流停滞致血液凝固。




图 3-9　栓子运行途径与栓塞模式图
栓子一般随血流方向运行。

