
1.**栓塞**：循环血液中出现不溶于血液的异常物质随血流运行阻塞血管腔的现象
可以是任何物质


2.栓子

血栓形成 血栓栓塞
（1）脱落的血栓（最常见）原位 VS 异位

①亚心炎、二狭、心梗等**左心**血栓脱落→**脑、肠、四肢动脉等体循环栓塞** 最常见脑栓塞(血流最丰富)

②**长期卧床等下肢深静脉血栓形成后脱落→肺动脉栓塞**









图 3-10　肺动脉血栓栓塞
长条状的混合血栓堵塞在肺动脉主干。

（2）**脂滴**
- 创伤性因素
- 非创伤性因素:脂肪肝、酗酒、精神过度紧张(使悬浮状态的血脂不稳定而游离相互融合形成脂滴)

股骨等长骨骨折（多<3 天）、脂肪肝创伤、**糖尿病**、胰腺炎、酗酒等→**肺动脉栓塞**为主、
脂代谢紊乱
也可体循环栓塞 脂滴过小可绕过肺动脉CAP,进入肺静脉、主动脉
①长骨(一体两端):长骨骨干内有丰富的黄骨髓(脂肪)
②骨折辨别脂肪栓塞/血栓栓塞看时间,短期(多<3天)为脂肪栓塞,长期为血栓栓塞

（3）气体
颈V外伤时对机体危害最大
①正压静脉输液等→空气栓塞 处死兔子

②**减压病/沉箱病/潜水员病→氮气栓塞**

（4）**羊水**
强调部位
分娩→**肺**栓塞（**肺小动脉和毛细血管内有角化上皮、胎毛**等）
羊水成分进入子宫静脉,回流到右心房→右心室→肺A
致**猝死**：过敏性休克、血管痉挛、DIC（羊过禁地）

菌栓　癌栓
（5）微生物、肿瘤细胞团、绒毛等栓子
阴道蓝紫色结节
- 绒癌:经血管转移至阴道致阴道坏死出血
- 侵袭性葡萄胎:绒毛入血作为栓子,经血管至阴道造成栓塞致阴道出血坏死

3.交叉性/反常性栓塞：来自静脉系统、右心的栓子，在右心压力升高时通过先天性房/室间隔缺损到达左心、引起体循环栓塞（栓塞各器官小动脉）

小凯笔记自行整理
室缺→感染性心内膜炎赘生物(左心)
↓
肺栓塞(突发呼吸困难胸痛)←通过室间隔缺损进入右心←脱落
↓
体循环栓塞尤其脑