四、梗死（缺血缺氧引起的坏死）

血栓栓塞最常见 ✕ 大鸡娃

1.原因：血栓形成最常见（如冠脉/脑动脉粥样硬化）、动脉栓塞、动脉痉挛、血管受压闭塞

左前降支常见 e.g 变异性心绞痛—冠脉自发痉挛


2.梗死灶

“都带门”

（1）**形状取决于血管分布方式**：心-地图形心电图、肠-节段形、脾/肾/肺-锥形（ttsx 尖端指向门）

肠系膜A供血一节一节

贫血性梗死 出血性梗死






图 3-11 肾动脉分支栓塞及肾贫血性梗死模式图




图 3-12 脾梗死
切面可见一个三角形梗死区。

（2）**质地取决于坏死类型**

①**心、肾、脾：凝固性坏死**

②**脑：液化性坏死**

脑质地软

天天师兄




图 3-13 肾贫血性梗死(镜下)
图为肾贫血性梗死灶边缘，右上侧为梗死区，可见肾小球、肾小管凝固性坏死，细胞核消失，但组织轮廓尚保存。左下角为正常肾组织，可见一个肾小球。

（3）颜色取决于病灶内含血量

凝固性坏死

①**贫血性/白色**：组织结构致密、侧支循环不充分的实质器官——心、肾、脾、脑心身疲劳

液化性坏死

容纳很多RBC

②**出血性/红色**：严重淤血（肺梗死先决条件）、组织疏松——肠、肺出场费

肺-双重血供，不容易发生梗死，只有影响到形成侧支循环(即淤血)才能发生梗死




图 3-14 肺出血性梗死
肺组织下部见一个楔形梗死灶，灶内肺组织出血坏死。



图 3-15 肠出血性梗死
梗死的肠壁呈暗红色。