随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

5.2015N45 A 使用正压静脉输液时，可能会发生的栓塞是

A.肿瘤栓塞

B.血栓栓塞

C.空气栓塞

D.脂肪栓塞

6.2016N135-136 B

A.血小板凝块 白色血栓

B.红细胞凝块

C.纤维蛋白凝块 纤维素性血栓

D.血小板和纤维蛋白相间的凝块

急性风湿性心内膜炎二尖瓣上的血栓主要成分是

弥漫性毛细血管内凝血时，血栓的主要成分是

7.2016N164 X 发生肺出血性梗死时，切片中能看到与出血性梗死相关的病变有

A.~~肉芽肿~~形成 肉芽组织

B.含铁血黄素颗粒 血液淤积于小V和CAP→肺泡CAP扩张→压力↑、通透性↑→破裂→RBC漏出

C.肺组织坏死

D.肺泡内大量红细胞

巨噬细胞吞噬

红细胞离开血管

8.2017N30 A 急性左心功能衰竭导致肺出血的原因是

A.肺静脉小分支破裂 壁厚不易破 肺小静脉瘀血→与支气管静脉建立侧支→支气管静脉压力↑→支气管静脉破裂

B.肺动脉小分支破裂

C.肺静脉端毛细血管漏出增加

D.肺动脉端毛细血管漏出增加

e.g 左心衰,二尖瓣狭窄出现大咯血机制:肺静脉回流障碍→血液淤积在肺小静脉和毛细血管→与支气管静脉建立侧支→支气管静脉压力↑→支气管静脉破裂

痰中带血

大咯血

9.2019N31 A 休克死亡的患者，其组织切片中最常见的血栓类型是

A.混合血栓

B.透明血栓

C.白色血栓

D.红色血栓

10.2019N126-127 B

A.空气栓塞

B.氮气栓塞

C.脂肪栓塞

D.血栓栓塞

深度潜水快速上浮时可能产生的栓塞是

长骨骨折患者出院后卧床休息 3 周，起立后突然死亡的原因可能是

答案：5-10 C AC BCD C B BD