
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（2）**血管通透性增加**内皮细胞



内皮细胞收缩及间隙增大	累及**细静脉（毛细血管后小静脉）**间隙-细
内皮细胞穿胞/吞饮增强	累及**细静脉**，与血管内皮生长因子 VEGF 有关
内皮细胞损伤-速发持续 （烧伤、化脓菌、白细胞介导）	累及全部微循环
新生毛细血管内皮细胞高通透性	累及毛细血管（在损伤修复中毛细血管再生包括**出芽式和套叠式**血管生成）新牙套

生长因子足够
吞饮能力↑

注意：

（1）**烧伤**引起血管通透性增加的机制（直白说）：①**主要**机制是**直接**损伤内皮细胞（使内皮细胞变性坏死脱落、基底膜受损），②**白细胞**介导的内皮细胞损伤，③内皮细胞**收缩**

（2）血管通透性增加是炎症时**液体和蛋白渗出**的主要原因，而**不是白细胞渗出的主要原因**，因为**白细胞**以阿米巴运动方式**主动**游出血管（VS **红细胞被动漏出血管**求你别出去）

即使血管的通透性增加,但内皮间直径还是比白细胞要小

烧伤引起血管通透性增加的机制
A.内皮细胞变性坏死
B.内皮下基底膜受损
C.血管扩张❌　血流动力学改变
血流动力学改变≠血管通透性增加




图 4-4　血管通透性增加的机制模式图
A. 内皮细胞收缩，累及细静脉；B. 内皮细胞损伤，累及全部微循环；C. 穿胞作用增强，累及细静脉；D. 再生内皮细胞，累及毛细血管。

血浆与组织液之间最大的差别是血浆里面含有较多的蛋白质,蛋白质牢牢的锁在血管里,所以血管通透性增加,蛋白质容易从血管跑到组织液,所以血管通透性增加就是炎症时液体蛋白渗出的主要原因不是白细胞渗出的主要原因。

二、炎症的表现

1.**红**（血管扩张充血）、**肿**（炎性渗出物）、**热**（局部和全身）、**痛**（渗出物压迫及炎症介质刺激）、**功能障碍**

炎症介质是致热源,会导致体温调定点升高,机体以为你冷了,就开始大量的增加产热

2.血 WBC 变化

升高	**多数细菌：中性粒细胞** 血吸虫　支哮喘 **寄生虫、过敏：嗜酸性粒细胞** **某些病毒：淋巴细胞、单核细胞**（林丹）　e.g 病毒性肝炎、病毒性心肌炎病、病毒性肺炎
下降	多数病毒、立克次体、原虫、伤寒杆菌（病历原伤寒）