


细胞核排列规律



细胞核杂乱,没有规律

（4）肉芽肿的栗子（一些没妈的疯姐姐压伤了矩阵猫伊恩）：异物（如缝线/石棉）、血吸虫虫卵、梅毒III期、麻风、风湿病（非感染肉芽肿）、结核、结节病（原因不明）、亚甲炎、伤寒（急性、全身单核-巨噬细胞系统增生）、特发性巨细胞性心肌炎、真菌、猫抓病、免疫反应性心肌炎、克罗恩病、慢性肉芽肿病(粒细胞功能缺陷)

树胶肿　本质变态反应疾病　巨细胞性甲状腺炎

受累器官形成很多肉芽肿

过氧化氢障碍→杀菌减弱→机体反复感染


血管通透性↑四、渗出液

1.比重＞1.018、蛋白＞30、细胞数多、＜血糖、混浊、易自凝

渗出蛋白质

感染、肿瘤都会消耗葡萄糖　渗出凝血因子,如纤维蛋白

2.白细胞渗出最特征



（1）急性炎症

①最早为中性粒细胞 小吞噬细胞

②24-48h 后为单核巨噬细胞 大吞噬细胞

（2）渗出过程

①白细胞边集和滚动：白细胞的 L 选择素、内皮细胞的 P/E 选择素

（选择部分白细胞靠边停车）

②白细胞黏附：白细胞的整合素（介导白细胞与内皮细胞、细胞外基质黏附）、内皮细胞的 E 选择素

③白细胞以阿米巴运动方式主动游出血管，白细胞游出通常发生在毛细血管后小静脉

④白细胞在组织定向趋化移动



调教　凝血酶调节蛋白:把凝血酶从促凝物变为抗凝物

（3）调理素增强吞噬细胞的吞噬作用，其指 IgG Fc 段、凝集素、C3b（调理肠胃 GGB）

无杀菌作用