间变：恶性肿瘤由未分化细胞构成，分化程度极低（**去分化**）、**异型性显著**、**极高恶性**。

如甲状腺未分化癌（小/梭形/巨/混合细胞型）小说剧情混乱

注意：

微观-病理科

①恶性肿瘤的分级靠**异型性**，如**分化程度、核分裂象**，级别越高恶性度越大、分化越低

宏观-肿瘤科

②恶性肿瘤的分期靠 TNM（**生长范围和播散程度**占地盘）：T 指原发灶的**大小**（如乳腺癌）、浸润**深度**（如早期胃癌不侵犯肌层）、浸润**范围**；N 指淋巴结转移；M 指远处转移

6.临床分期（**0 期-原位癌**）宫颈癌

I	癌局限于子宫颈内 ①早期/微小浸润癌：浸润深度≤基底膜下 5mm ②浸润癌：浸润深度＞基底膜下 5mm
II	癌进入盆腔、但未累及盆腔壁；癌侵及阴道、但未累及阴道下 1/3
III	癌侵及盆腔壁、阴道下 1/3（阴字偏旁像 3；删我）
IV	癌已超越骨盆、或累及膀胱或直肠

乳腺癌的TNM分期:T1≤2cm,2cm<T2≤5cm,T3>5cm,T4侵犯皮肤/胸壁(肋骨/肋间肌/前锯肌)/炎性乳癌 25




图 6-9　乳腺癌 TNM 分期的主要指标（AJCC，2017）

N 的详细说明如下。N_0：区域淋巴结未受累或仅有孤立肿瘤细胞。N_1：微转移；或累及同侧腋窝淋巴结 1～3 个；和 / 或临床阴性的内乳淋巴结的前哨淋巴结活检有微转移或宏转移。N_2：累及同侧腋窝淋巴结 4～9 个；或影像学检查显示同侧内乳淋巴结转移但腋窝淋巴结未受累。N_3：累及腋窝淋巴结 10 个或以上；或累及锁骨下淋巴结（腋窝Ⅲ水平）；或影像学检查显示同侧内乳淋巴结转移伴 1 个（或以上）Ⅰ、Ⅱ水平腋窝淋巴结受累；或超过 3 个腋窝淋巴结受累伴临床阴性的同侧内乳淋巴结的前哨淋巴结活检有微转移或宏转移；或累及同侧锁骨上淋巴结。