三、肿瘤的分类

1.**交界**性肿瘤：组织形态、生物学行为介于良恶性之间，呈**浸润性生长（易局部复发）、多不转移**，如**骨巨细胞瘤**、带状瘤、**侵袭性葡萄胎**、卵巢浆液性乳头状囊腺瘤

侵犯子宫肌层和或血管(水泡状绒毛侵入子宫肌层)、几乎不转移(阴道蓝紫色结节是梗死)


VS绒癌:经血管转移至阴道导致阴道出血坏死

浆液性更容易长乳头

乳头越多越偏向恶性

（古巨基吃了一袋葡萄、冻僵了卵巢）

2.良性肿瘤 VS 恶性肿瘤（一般规律）

良性肿瘤	恶性肿瘤
分化相对好（异型性相对小）	分化差（异型性大）
核分裂象无或少，无病理性核分裂象	核分裂象多，可见**病理性核分裂象**
多规则、**边界较清楚（包膜完整）** 记特殊 但子宫平滑肌瘤无包膜 结甲包膜不完整VS甲状腺腺瘤包膜完整	多不规则、**边界不清（无包膜）** 记特殊但甲状腺滤泡癌有包膜 与滤泡瘤通过生物学行为鉴别 但大量淋巴细胞浸润的乳腺髓样癌边界清楚 大清软软的
出血、坏死少见	**出血、坏死、溃疡形成等多见**
多生长**缓慢**，**膨胀**性生长	多生长**迅速**，**浸润**性生长
体表肿瘤、体腔肿瘤、管道器官腔面、骨软骨瘤可呈**外生**性生长 良性-外生膨胀	恶性-外生浸润  骨软骨瘤
少复发	**多复发**（术中切缘组织冰冻切片了解有无肿瘤浸润以确定是否需要扩大切除范围）
不转移	**会转移**
没有副肿瘤综合症	常有副肿瘤综合症
生长部位是对机体影响最大的因素	对机体影响大

副肿瘤综合征-伴随肿瘤的综合征

eg.小细胞癌产生抗利尿激素(异位内分泌综合征)

注意	浸润性生长	转移
多数良性肿瘤	×	×
良性肿瘤 **脉管瘤（血管瘤、淋巴管瘤）**	√（易复发）	×
多数恶性肿瘤	√（易复发）	√
低度恶性 **皮肤基底细胞癌、卵巢粒层细胞瘤**	√	**很少**基粒来不及转移

≠淋巴瘤(来自淋巴造血系统或者来自于免疫系统)

卵泡膜细胞瘤:良性




图 6-1 肿瘤的常见大体形态和生长方式示意图