动脉粥样硬化的血管内膜形成斑块→压迫血管中膜平滑肌→血管中膜平滑肌损伤(血管中膜平滑肌能防止血管过度扩张)→在血管内压力的作用下,动脉壁局限性扩张→动脉瘤

（2）这些“瘤”不是肿瘤：

粥瘤、ttsx 黄色瘤	黄色瘤即 AS 时含大量胆固醇的巨噬细胞显著增多聚集在皮下
动脉瘤 见于心肌梗死 室壁瘤	注意：动脉瘤不是肿瘤、血管瘤是良性肿瘤；淋巴瘤是恶性肿瘤、淋巴管瘤是良性肿瘤；黄色瘤不是肿瘤、绿色瘤是恶性肿瘤
结核瘤、梅毒瘤	梅毒瘤即III期梅毒树胶肿（肉芽肿）
迷离瘤	误位于异常部位的正常组织（迷路了），如胃内出现胰腺、舌根出现甲状腺、ttsx 子宫内膜异位症如子宫腺肌瘤
炎性假瘤	慢性非特异增生性炎
创伤性神经纤维瘤	神经纤维的修复异常：再生的神经纤维和增生的结缔组织混杂卷曲

注意：以前认为错构瘤指正常组织在发育过程中出现错误排列，不是肿瘤；而现在认为错构瘤是肿瘤

周围神经系统神经纤维是否可以再生取决于所属的神经元胞体是否存活,若存在异地恋、分手、小三都会导致再生的神经纤维与增生的结缔组织混杂在一起(创伤性神经瘤)

2.有些肿瘤以“病”命名，但均为恶性肿瘤，如白血病、Bowen 病/原位鳞癌、霍奇金病、非霍奇金病、**Paget 病** 乳头湿疹样乳腺癌

3.畸胎瘤：性腺或胚胎剩件中全能细胞发生的肿瘤，多含有 2-3 个胚层多种成分，可以是**良性（成熟）**、可以是**恶性（未成熟）**

注意：良性的单胚层畸胎瘤有皮样囊肿、卵巢甲状腺肿

4.癌 VS 肉瘤

癌	肉瘤
来源于上皮组织	**来源于间叶组织**（结缔组织、肌肉、脂肪、血管、淋巴管、淋巴造血、骨、软骨）
发病率高、多见于 40 岁以上	发病率低（骨肉瘤等多见于儿童和青少年、脂肪肉瘤等多见于中老年）
一般质硬、色灰白、干燥	一般质软、色灰红、湿润、鱼肉状
癌细胞多形成癌巢，实质与间质多分界清楚，纤维组织常有增生  	肉瘤细胞多弥散分布，实质与间质多分界不清，间质血管丰富、纤维组织少 
网状纤维围绕癌巢、癌细胞间多无网状纤维	肉瘤细胞间多有网状纤维
上皮标记（角蛋白 CK、上皮膜抗原 EMA）	**间叶标记（波形蛋白 Vimentin** 波-肉）
多数癌早期淋巴转移、多在晚期血道转移	**血道**转移

网状纤维:嗜银细胞可被染成黑色,可帮助判断到底是癌还是肉瘤