七、常见肿瘤的特点

1.鳞癌

①鳞癌发生于有鳞状上皮的组织、或发生鳞化的组织

eg.膀胱鳞癌:膀胱的移形上皮化生成了鳞状上皮

②高分化鳞癌：癌巢中央有癌珠/角化珠、细胞间有细胞间桥（高龄华侨）

①鳞状上皮才会角化
②高分化/异型性小才会角化




图 6-12 鳞状细胞癌
高分化鳞状细胞癌。癌组织在间质中浸润性生长，可见大量癌巢和角化珠。




图 6-13 结肠腺癌
左上角可见正常黏膜。腺癌细胞形成不规则的腺样结构，在黏膜下层浸润生长。


2.腺癌

①高分化腺癌：如小管癌（大量腺体或腺样形成）

②低分化腺癌：

单纯癌/实性癌	实质=间质	条索状
硬癌	实质＜间质（大量纤维组织增生）	
髓样癌	实质＞间质（软软的）	巢状、乳头状、滤泡状等

③能分泌大量粘液的腺癌为黏液腺癌/胶样癌（肿瘤含>50%的黏液成分），肉眼可表现为胶冻样外观，但仍属于组织学类型。癌细胞分泌大量粘液至细胞外形成粘液湖、使癌细胞团漂浮于粘液中；癌细胞分泌大量粘液潴留在细胞内将核推向一侧为印戒细胞癌（属于低黏附性癌）



3.腺鳞癌：癌组织内有腺癌和鳞癌两种成分，可有角化珠、腺体或腺样形成

4.皮肤基底细胞癌

①多见于老年人头面部

经久不愈的溃疡 鼠咬状溃疡

②生长缓慢、常形成溃疡、浸润破坏深层组织，但很少转移、恶性度低

③对放疗敏感 放老鼠药