5.脂肪瘤（最常见的软组织良性肿瘤）：常为分叶状、切面呈黄色
骨组织以外的间叶组织肿瘤又常称为软组织肿瘤


6.骨肉瘤（最常见的原发恶性骨肿瘤）


①好发于长骨**干骺端**（尤其股骨下端和胫骨上端）膝

碱性磷酸酶↑

②肿瘤细胞可溶骨、可**成骨（诊断骨肉瘤最重要依据）**

③**骨膜反应：Codman 三角、日光射线**





八、致瘤因素

HPV编码的E6蛋白使P53失活,E7蛋白使RB失活

致瘤因素	常见恶性肿瘤	致瘤因素	常见恶性肿瘤
多环芳烃 烧烤(吸进去/吃进去)	肺癌、胃癌	**华支睾吸虫**	**肝内胆管癌**
芳香胺类 印染厂	膀胱癌（蹄髈香）	**血吸虫**	日本→**大肠腺癌** 埃及→**膀胱鳞癌** 膀胱的移形上皮变成了鳞状上皮再发生癌变
黄曲霉素 霉变花生谷物	肝细胞癌	**HPV**	**宫颈癌、喉癌**
亚硝胺类 亚硝酸进入胃后变为亚硝胺	结构对称者→肝癌 结构不对称者→食管癌	**EBV**	**鼻咽癌、CHL、Burkitt 淋巴瘤、NK/T 细胞淋巴瘤**（比伯穿 CK） 传染性单核细胞增多症
烷化剂	白血病（白化病）	**HBV、HCV**	**肝细胞癌**
紫外线	皮肤癌、黑色素瘤	**Hp**	**胃癌、胃淋巴瘤 MALT**

260nm的紫外线会导致嘧啶二聚体形成

HPV与宫颈癌、喉癌、尖锐湿疣相关
Hp与慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌、胃淋巴瘤相关

基因病(多因素、多基因、多步骤)九、肿瘤的发病机制





图 6-30　结直肠癌的多步骤发生模式



自己和自己比较

原癌基因-对细胞增殖起正性调控
抑癌基因-抑制细胞生长

图 6-31　肿瘤形成和演进的基本模式