

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

H^+-二/三肽在小肠的吸收 寡肽	串：蛋白质分解产物在小肠的吸收 ①氨基酸：依赖 **Na^+**的继发性主动转运 ②寡肽：依赖 **H^+**的继发性主动转运（更**快**）寡人爱卿更快



（二）反向转运举例


1.H^+-突触囊泡膜再摄取递质。**利血平**抑制囊泡再摄取递质→突触传递↓（耗竭多巴胺回不了家）→**治疗舞蹈病、禁用帕金森（中脑黑质受损致多巴胺↓）**




回忆：位于细胞器膜的 H^+-ATP 酶可将 H^+转运至囊泡等细胞器内


小囊泡比较轻（H）、不听话（反向转运）、出血了就听话了（利血平抑制）

对比：突触前膜再摄取递质为依赖 Na^+的同向转运，被阿米替林抑制→治疗抑郁症





2.Na^+-H^+或 Na^+-NH_4^+交换（**肾近端小管分泌 H^+或 NH_4^+**的主要形式）



3.Na^+-Ca^{2+}交换。当钠泵（原发性主动转运）被哇巴因抑制后→Na^+-Ca^{2+}交换等继发性主动转运也会被**抑制**

