

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

4.酪氨酸激酶受体（受体型酪氨酸激酶）TKR/RTK（受体本身有酪氨酸激酶的活性）

狠起来连
自己都搞






（1）**配体：胰岛素、生长因子**（如胰岛素样生长因子 insulin-like growth factor,IGF、表皮生长因子 Epidermal growth factor,EGF）老医生


胰岛素 样

需注意 **IGF 主要来自生长激素**，所以生长激素既可经 TKAR、又可通过产生 IGF 经 TKR

酪氨酸激酶结合型受体　酪氨酸激酶受体

（2）以 EGF 为例，介绍酪氨酸激酶受体通路





①EGF 结合 EGFR→**激活 EGFR 自带的酪氨酸激酶**活性→使**受体自身**的酪氨酸发生磷酸化

②**Grb_2 是衔接蛋白（接头蛋白）**，它通过重要的结构域（蛋白质中发挥特殊功能的区域）SH_2、SH_3 起着承上启下的作用——**SH_2 识别结合磷酸化的酪氨酸如 EGFR、SH_3 识别结合富含脯氨酸的蛋白质如 SOS** 救命啊富不过三代

