酸性氨基酸　碱性氨基酸

4.其它蛋白激酶还有半胱氨酸激酶、谷/天冬氨酸激酶酸谷天、赖/精/组氨酸激酶捡来金猪。因此**常发生磷酸化的氨基酸有酪氨酸、苏氨酸、丝氨酸、半胱氨酸、酸性氨基酸、碱性氨基酸，以前三者更常见**老鼠尿拌蒜尖

真题解析·细胞信号转导（生理+生化）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

生理学

1. 2013N156 X 在激素作用的机制中发挥第二信使作用的物质有

A.cGMP
B.Ca^{2+}
C.cAMP
D.DG

A cAMP　D DG/DAG　花生 花生四烯酸衍生物　钙 Ca2+　奶 cGMP　献给 神经酰胺　IP3 PIP3　7 气体

cGAMP　cADPR

2. 2014N151 X 既可作用于 G 蛋白耦联受体又可作用于通道型受体的配体有

A.肾上腺素 GPCR　骨干已设定
B.乙酰胆碱
C.γ-氨基丁酸
D.心房钠尿肽 GC

3. 2015N151 X 以下选项中，可作用于酶联型受体实现信号转导的配体有

A.肾上腺素 GPCR
B.心房钠尿肽 GC
C.胰岛素 TKR
D.甲状腺激素 核受体

GC受体 NO、CO、钠尿肽　Ser/Thr受体 TGF　TKR 胰岛素生长因子　TKAR 瘦白红乳长(生长因子、生长激素)干产　NF-κB

4. 2018N14 A 甲状腺激素作用于靶细胞产生生物学效应的受体属于

A.核受体 李维嘉
B.离子通道型受体
C.酪氨酸激酶受体
D.G 蛋白耦联受体

5. 2019N136 X 需要胞质内第二信使介导信号转导的受体有（多选题不是推的）

A.核受体
B.G 蛋白耦联受体
C.离子通道型受体
D.鸟苷酸环化酶受体

GPCR:cAMP　IP3 Ca2+ DG cGMP↓
GC:cGMP
PI3K:PIP3

6. 2020N136 X 可通过激活酪氨酸激酶受体而完成细胞信号转导的配体有

A.肾上腺素　老医生
B.乙酰胆碱

答案 1—6 ABCD BC BC A BD CD