

C.胰岛素
D.神经生长因子

生物化学


7. 2013N38 A G 蛋白耦联受体信号的主要途径是
A.cAMP-PKA 信号途径
B.酪氨酸激酶受体信号途径
C.雌激素-核受体信号途径
D.丝/苏氨酸激酶受体信号途径



8. 2014N39 A 在经典的信号转导途径中，受 G 蛋白激活直接影响的酶是
A.PKC
B.MAPK
C.JAK
D.AC




9. 2014N159 X 参与受体型 TPK-RAS-MAPK 途径的分子有
A.RAS 蛋白
B.Grb_2
C.EGF 受体
D.Raf 蛋白



10. 2015N39 A 以下蛋白质中，属于小 G 蛋白的是
A.异三聚体 G 蛋白
B.Grb_2
C.MAPK
D.Ras

G 蛋白	RAS 蛋白
结合 GTP 是激活态、结合 GDP 是失活态，自身有 **GTP 酶**的活性	
α、β、γ 三聚体（有四级结构）	仅有一条多肽链（只有三级结构）
异三聚体 G 蛋白	**小 G 蛋白**、低分子量 G 蛋白
GPCR	**TKR-RAS-MAPK**

11. 2015N159 X 以下选项中，可参与 GPCR 通路的分子有
A.G 蛋白
B.cAMP
C.FAD
D.AC



12. 2016N160 X 参与 G 蛋白耦联受体介导信号转导通路的分子有
A.7 次跨膜受体
B.G 蛋白
C.腺苷酸环化酶
D.CMP

13. 2017N27 A 以下关于蛋白激酶的叙述中，正确的是
A.底物可以是脂类物质 底物是蛋白质
B.可使亮氨酸残基磷酸化 老鼠屎拌蒜尖
C.蛋白质磷酸化后活性改变

答案 7-13 A D ABCD D ABD ABC C