D.属于第二信使物质 蛋白激酶被第二信使激活


14. 2017N147 X 下列具有酪氨酸激酶活性的转导信号分子有

A.MAPK 丝苏氨酸激酶

B.G 蛋白 自带GTP酶活性

C.Src 蛋白激酶

D.表皮生长因子受体



瘦白红乳长干产=酪氨酸激酶结合型受体≠酪氨酸激酶

15. 2018N28 A 可作为信号转导第二信使的物质是

A.腺苷酸环化酶 效应器

B.一磷酸腺苷 cAMP才是第二信使

C.甘油二酯

D.生长因子 配体(第一信使)


16. 2019N27 A 参与糖原合成与分解的主要信号途径是

A.RAF-MEK-ERK

B.JAK-STAT

C.G 蛋白-PLC-IP_3

D.G 蛋白-cAMP-PKA



17. 2020N27 A 下列属于酶偶联受体的配体是

A.肾上腺素 GPCR

B.γ-干扰素

C.乙酰胆碱

D.甲状腺素




18. 2021N27 A 能与富含脯氨酸的蛋白质结合的分子结构域是

结构域	识别
A.SH_2	磷酸化Tyr
B.SH_3	SOS
C.PTB	磷酸化Tyr
D.PH	PIP3

胰岛素 → IR-P → IRS-Ⓟ (PTB) → Grb2-SH2

酶联型受体



19. 2021N145 X 具有酶催化活性的受体有


A.G 蛋白耦联受体 G蛋白✗ 因为不是受体

B.表皮生长因子受体

C.核受体

D.转化生长因子受体

干扰素受体✗ 属于酪氨酸激酶结合型受体 可选



20. 2022N27 A 细胞内受体的性质是

A.转录因子

B.激素反应元件

C.酪氨酸激酶

D.表皮生长因子

答案 14—20 CD C D B B BD A