
3.血型遵循孟德尔遗传定律：



基因型：

A 型 I^AI^A 或 I^Ai

B 型 I^BI^B 或 I^Bi

AB 型 I^AI^B

O 型 ii

因此 A 型和 B 型能生出 A、B、AB、O 型

二、Rh 血型

1.Rh 抗原（**D** 抗原）只存在于红细胞膜，抗原特异性取决于红细胞膜蛋白质氨基酸序列。多数人红细胞膜 Rh 抗原+（有 D 抗原）oh 是 DR

O型血有H抗原

2.**Rh 血型系统没有天然抗体**（Rh-没有 D 抗原、血中并没有 D 抗体），**主要抗体为免疫抗体 IgG**：



①Rh-者若从未接触 D 抗原，则第一次接受 Rh+者的血液、不会立即发生抗原-抗体反应（溶血）；但输血后 Rh+的 D 抗原会刺激 Rh-者产生免疫抗体，输血后 2-4 个月 D 抗体达高峰，因此当**第二次**输 Rh+者的血液时，之前的免疫抗体就会和 Rh+者红细胞发生抗原-抗体反应（溶血）红细胞寿命 120 天、短于抗体达高峰时间

②同理，因为妊娠末或分娩时才有足量的胎儿红细胞进入母体，因此 Rh-**母亲**怀 Rh+**胎儿**的溶血反应发生在**第二胎**（母体内的 Rh 抗体进入胎儿引起**新生儿溶血**）

