B.抑制 COX
C.抑制 PGI_2 合成酶
D.抑制 PLA_2

8. 2017N3 A 生理性止血过程中促进血小板发生不可逆聚集的主要原因　第二聚集时相
A.血管内皮受损，PGI_2 生成减少 PGI_2,NO抗Plt聚集
B.血管内皮受损，内皮下胶原暴露 胶原一样会促进聚集,但不是不可逆
C.血小板释放 ADP、TXA_2
D.血小板收缩蛋白收缩

9. 2018N3 A 生理性止血过程中，与识别损伤部位有关的血小板的生理特性是
A.血小板黏附 胶原纤维 VWF GPIb
B.血小板聚集
C.血小板释放
D.血小板吸附

10. 2020N4 A 病人在行远端回肠切除术后可发生的贫血是　$VitB_{12}$吸收障碍
A.恶性贫血 A型胃炎→攻击壁细胞内因子的抗体→内因子下降↓$VitB_{12}$回肠重吸收↓此时为巨幼贫的特殊情况(恶性贫血)
B.溶血性贫血
C.再生障碍性贫血
D.巨幼细胞性贫血

11. 2021N136 X 因体内缺乏维生素 B_{12} 而导致巨幼细胞性贫血的原因是
A.胃酸分泌不足 HCl和内因子是伴行关系,盐酸少的时候一般都会伴有内因子减少,但不是因为盐酸分泌不足导致$VitB_{12}$重吸收障碍,是内因子不足导致
B.胃大部切除术后 壁细胞↓→缺乏内因子
C.体内产生抗内因子抗体 内因子↓
D.末端回肠切除术后 吸收障碍

多选题不是推的，多选题是命题者翻到某一页出的，以下为 10 版教材 P59

（2）叶酸和维生素 B_{12}：叶酸和维生素 B_{12} 是合成 DNA 所需的重要辅酶。血浆中叶酸主要以 N^5-甲基四氢叶酸形式存在。进入细胞后，N^5-甲基四氢叶酸在体内须转化成四氢叶酸后，才能参与 DNA 的合成。叶酸的转化需要维生素 B_{12} 的参与。维生素 B_{12} 缺乏时，叶酸的利用率下降，可引起叶酸的相对不足。因此，缺乏叶酸或维生素 B_{12} 时，DNA 的合成障碍引起细胞核发育减慢，幼红细胞分裂减慢，而胞质 RNA 合成不受影响，胞质成分（包括血红蛋白）形成相对正常，胞核发育滞后于胞质，红细胞体积增大，导致巨幼细胞贫血（megaloblastic anemia）。正常情况下，食物中叶酸和维生素 B_{12} 的含量能满足红细胞生成的需要，但维生素 B_{12} 的吸收需要内因子（intrinsic factor）的参与。内因子由胃黏膜的壁细胞产生，它与维生素 B_{12} 结合后通过回肠黏膜上特异受体的介导，促进维生素 B_{12} 在回肠远端的吸收。当胃大部分切除或胃的壁细胞损伤时，机体缺乏内因子，或体内产生抗内因子抗体，或回肠末端被切除后，均可因维生素 B_{12} 吸收障碍而导致巨幼细胞贫血。但在正常情况下，体内储存有 4～5mg 维生素 B_{12}，而红细胞生成每天仅需 2～5μg，故当维生素 B_{12} 吸收发生障碍时，常在 3～5 年后才出现贫血。正常人体内叶酸的储存量为 5～20mg，每天叶酸的需要量约为 200μg，当叶酸摄入不足或吸收障碍时，3～4 个月后可发生巨幼细胞贫血。

答案:8-11 C A D BCD