随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、血液凝固

（一）凝血途径简述




图 3-8　凝血过程三个基本步骤

→催化作用；→变化方向。

凝血酶原酶复合物（凝血酶原激活复合物）：10a-5a-Ca^{2+}-PL（PL 指血小板提供的磷脂表面）

凝血酶：2a。active

1→1a→n1a：纤维蛋白原变为纤维蛋白并交织成网即血液凝固（10÷5=2÷1；一千零二夜）　（自我催化正反馈）

（二）凝血途径详述




图 3-10　凝血过程示意图

→催化作用；→变化方向；⇢正反馈促进；PL，磷脂；PK，前激肽释放酶；K，激肽释放酶；HK，高分子量激肽原；罗马数字表示相应的凝血因子。


拳皇97：内、外源性途径第一次相遇

3 不是酶原、所以不写 3a

本身就存在一定的 7a

没有因子 6（6 即活化的 5）

98 酒吧-男生、37 女生节-女生



5a 给 10a 打辅助：凝血酶原酶复合物中发挥催化作用的是 10a，而 5a 使 10a 激活 2 的效力增加 10000 倍

真正的酶

1.外、内源性凝血途径

	外源性凝血途径	内源性凝血途径
如何激活 10 分水岭	3-7a-Ca^{2+}（FX酶复合物）→10 （3 给 7a 打辅助：3 使 7a 激活 10 的效力增加 1000 倍）	12a→11a→9a-8a-Ca^{2+}-PL（FX酶复合物）→10 （8a 给 9a 打辅助：8a 使 9a 激活 10 的效力增加 20 万倍）倍数不用背
起始因子	3（组织因子 TF tissue factor）	12 1 年 12 个月、1 季度 3 个月
其它	步骤少、速度快 外快	胶原或异物激活 12、12a 激活前激肽释放酶→又激活 12，构成 12 自我催化正反馈激活