随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有




图 3-4　内皮细胞的抗凝和促凝作用

抗凝作用：①合成前列环素（PGI_2）、一氧化氮（NO）和分泌腺苷二磷酸酶（ADP 酶）；②合成凝血酶调节蛋白；③合成蛋白 S；④合成膜相关肝素样分子；⑤合成组织型纤溶酶原激活物（t-PA）。

促凝作用：①释出组织因子；②分泌纤溶酶原激活物抑制物（PAI）；③释出 vWF。

小结：

高腹肌杀死我吧:高分子量激肽原、3、4、5、8

①抗凝血酶抑制：凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）除开因子1、13、凝血辅因子


②依赖 VitK 合成的凝血因子：2、7、9、10 儿妻就是家

③被消耗的凝血因子：1、2、5、8、13 小豪是个十三点打我儿一巴掌

更不稳定

④5、8：最不稳定的凝血因子（被蛋白质 C 系统灭活）、凝血辅因子（与 Ca^{2+}和 PL 分别组成凝血酶原酶复合物和内源性凝血途径 FX 酶复合物）、可被凝血酶激活


⑤ttsx 凝血酶的作用：




vs TFPI:组织因子途径抑制物(抗凝)

TAFI以抗纤溶　稳定凝血块

⑥





辅因子

血友病　"学吧友友们一起出血"

需VitK