随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

专题串联·小结与临床

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）BT、PT、APTT、TT

①**BT 出血时间**：当**血小板**减少或功能降低时出血时间 BT 延长，但几乎对**凝血时间没有影响**（虽然血小板参与凝血、但凝血过程所需的血小板 ddmm 少）

②**PT 凝血酶原时间**：在血浆**加入 Ca^{2+}和组织因子**以观测血浆的凝固时间，PT 反映**外**源性凝血途径（即反映凝血因子 **7**、10、5、2、1）

实验本身已加3因子

共同途径

③**APTT 活化的部分凝血活酶时间**：APTT 反应**内**源性凝血途径（即反映凝血因子 12、11、9、8、10、5、2、1），主要反映**血友病**（遗传缺乏 8、9、11）

（外源性步骤少对应 PT 字母少、内源性步骤多对应 APTT 字母多）

延长 BT PT APTT TT

缺乏 plt 外 内 I

7 12

10 11 血

5 9 友

2 8 病


1 10

5

2

1

凝血 抗凝 纤溶 ④**TT 凝血酶时间**：TT 反映**纤维蛋白原（凝血因子 1）**，若缺乏因子 1 则 TT 延长



D-二聚体是最简单的纤维蛋白降解产物：有纤溶就会有 D-二聚体，因此 D-二聚体是一种纤溶标记物，敏感性很高，若血浆 D-二聚体＜500μg/L 可排除急性肺血栓栓塞

《内科》

低危	中危	高危/大面积
无右心功能不全 血压正常	右心功能不全 血压正常 左心可代偿	右心功能不全 十版改变 血流动力学不稳定（休克即收缩压＜90mmHg、收缩压降低≥40mmHg、或心搏骤停）就是高危
不溶栓 直接抗凝	先抗凝 可考虑溶栓	先溶栓（rt-PA 等） 再抗凝（普通肝素等）

均需抗凝

下肢深V血栓脱落→血液循环流至肺

激活纤溶系统,有纤溶就有D-二聚体

《内科》:急性肺血栓栓塞最基本治疗:抗凝,常用普通肝素、磺达肝癸钠