随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（二）抗板、抗凝、溶栓

抗板-抗血小板聚集、抗凝-抑制纤维蛋白形成、溶栓-溶解已形成的纤维蛋白等

抗凝	肝素	增强抗凝血酶活性（主要） 促进 TFPI 释放	ttsx 体内＞体外抗凝
抗凝	华法林	拮抗 VitK（抑制凝血因子 2、7、9、10 的合成）	体内抗凝
抗凝	枸橼酸、草酸	螯合 Ca^{2+}	体外抗凝 （库存血常加入枸橼酸钠）
抗板	阿司匹林、吲哚布芬	抑制环氧化酶 COX-1→TXA_2↓	抗血小板聚集
抗板	氯吡格雷、替格瑞洛	拮抗 ADP 受体	
抗板	阿昔单抗、替罗非班	拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体 阿昔替我上班	
溶栓	t-PA、尿激酶	激活纤溶酶原 12月了,突击	溶栓

①肺血栓栓塞主要是抗凝，主要用肝素。肺血栓栓塞来自下肢深静脉血栓形成、病根在静脉系统形成了血栓。静脉系统血流相对较慢、容易激活凝血途径

②冠心病主要抗血小板，主要用阿司匹林。冠心病即冠状动脉粥样硬化性心脏病、是发生在动脉系统的问题。动脉系统血流相对较快、容易致血小板析出

（流速快→容易沉积，是指在动脉系统，沉积的是血小板

流速慢→容易凝固，是指在静脉系统，凝血因子浓度高）

③急性心肌梗死包括 ST 段抬高型心梗、非 ST 段抬高型心梗：ST 段抬高型心梗可考虑溶栓，非 ST 段抬高型心梗禁止溶栓（非 ST 段抬高型心梗冠脉内为白色血栓、成分主要是血小板，而溶栓是溶解已经形成的纤维蛋白）此时溶栓无意义,反而易引起不良反应(打破平衡)

真题解析·生理性止血

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N5 A 凝血酶的主要作用是 激活/分解纤维蛋白原

A.激活因子XIII
B.分解因子I
C.活化血小板
D.激活因子VIII

2
凝血酶原

凝血酶原→凝血酶：　酶原变成酶:水解一部分AA/肽链
①凝血酶最主要的是激活（或分解）因子 1 形成或暴露活性中心
②还可激活因子 5、8、11、13、血小板（除 13 以外为正反馈）
双十一医生要我爸查血小板。正反馈为等差数列

凝血酶+TM < PC → 灭活5、8
TAFI → 抗纤溶

答案：1 B