随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2. 2014N5 A 以下凝血因子中，需要维生素 K 参与其合成的 儿妻就是家
A.因子I、因子III、因子VIII、因子XII
B.因子II、因子VII、因子IX、因子X
C.因子III、因子VII、因子X、因子XI
D.因子V、因子VIII、因子IX、因子XI

高腹肌杀死我吧:高分子量激肽原、3、4、5、8
①抗凝血酶抑制：凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）除开因子1、13、凝血辅因子
②依赖 VitK 合成的凝血因子：2、7、9、10 儿妻就是家
③被消耗的凝血因子：1、2、5、8、13 小豪是个十三点打我儿一巴掌

3. 2015N5 A 以下选项中，凝血酶原(2)酶复合物的组成是 10÷5=2÷1
A.FIII-FVIIa-Ca^{2+}-PL
B.FXa-FVa-Ca^{2+}-PL
C.FIIa-FXa-Ca^{2+}-PL
D.FIXa-FVIIIa-Ca^{2+}-PL

4. 2016N152 X 以下物质中，能使纤溶酶原激活为纤溶酶的有 纤溶酶原激活剂"12月了,突击"
A.蛋白质 C 抗凝
B.凝血因子XIIa
C.尿激酶
D.激肽释放酶

1组织型纤溶酶原激活物t-PA
2尿激酶型纤溶酶原激活物u-PA(尿激酶UK)
3激肽释放酶
4凝血因子XIIa

5. 2017N136 X 肝素抗凝血作用的机制有
A.促进组织因子途径抑制物的释放
B.促进纤溶酶原的激活
C.增强抗凝血酶的活性 最主要
D.抑制因子V的激活

肝素	增强抗凝血酶活性（主要） 促进 TFPI 释放	ttsx 体内＞体外抗凝

6. 2018N137 X 血友病的产生原因有 遗传缺乏8、9、11
A.缺乏维生素 K
B.缺乏凝血因子V
C.缺乏凝血因子VIII
D.缺乏凝血因子IX

学吧友友们一起出血

7. 2019N3 A 临床上在体内和体外均可用于抗凝血的物质是
A.肝素 抗凝:体内＞体外(因为TFPI释放增多)
B.华法林 体内
C.草酸钾 体外
D.前列环素 PGI2 抗板

8. 2020N5 A 肝硬化患者易发生凝血障碍的主要原因是
A.Ca^{2+}缺乏
B.维生素 K 相对不足
C.凝血因子合成减少
D.血小板功能减退

假性血友病
9. 2021N4 A 血管性血友病的发生机制是
A.FVIII缺乏

	(出血时间)BT Plt、血管壁	APTT 内源性途径	PT 外源性途径
血管性血友病	延长 缺乏vWF	延长 影响VIII	正常
血友病	正常	延长 因子	正常

答案:2-6 B B BCD AC CD
7-9 A C D