随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

B.PF_4 缺乏
C.VitK 缺乏
D.vWF 缺乏 →8因子不稳定

10. 2023N137 X 属于生理性抗凝物质的有
A.蛋白质 C
B.组织因子途径抑制物
C.纤溶酶原激活物抑制物-1 PAI
D.肝素

	来源	功能
anti **抗凝血酶 AT** （属于丝氨酸蛋白酶抑制物）	肝 血管内皮细胞	抑制凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱） （除开因子 1、13、凝血辅因子）记少不记多 高腹肌杀死我吧:高分子量激肽原、3、4、5、8
肝素	嗜碱性粒细胞 肥大细胞 减肥	①**增强抗凝血酶的活性以间接抗凝（主要）** ②促进结合在血管内皮表面的 **TFPI** 释放→特异性抑制**外**源性凝血途径→**肝素抗凝体内＞体外**
蛋白质 C 系统 （PC、PS、TM、PC 抑制物）	肝（PC） 内皮（TM）	**灭活不稳定的凝血因子 5a、8a** 五八同城不稳定 **vWF 提高因子 8 的稳定性（避免 8 被 APC 降解）** vWF使8a比5a更稳定
组织因子途径抑制物 （tissue factor pathway inhibitor,**TFPI**）	血管内皮细胞	TFPI 只有先结合凝血因子 **10** 后、才能结合 **3-7a-Ca^{2+}复合物**抑制其活性，即 TFPI 并不阻断组织因子对外源性凝血途径的启动、而待到生成一定数量的 10 后才**负**反馈抑制**外**源性凝血途径

11. 2024N4 A 蛋白质 C 系统的抗凝血机制是 58同城不稳定
A.灭活 FVIIIa 和 FVa
B.抑制 FVIIa-FIII复合物
C.增强抗凝血酶活性
D.拮抗维生素 K 的作用

12. 2024N136 X 凝血酶（FIIa）对血液凝固过程的正反馈作用有
A.使 FV活化为 FVa
B.使 FVIII活化为 FVIIIa
C.使 FXI活化为 FXIa
D.使 FXIII活化为 FXIIIa

2 **凝血酶原**	凝血酶原→凝血酶：　酶原变成酶:水解一部分AA/肽链 ①**凝血酶最主要的是激活（或分解）因子 1** 形成或暴露活性中心 ②**还可激活因子 5、8、11、13、血小板（除 13 以外为正反馈）** 双十一医生要我爸查血小板。 11 13 1 5 8　正反馈为等差数列

13. 2025N4 A 能明显增加组织型纤溶酶原激活物对纤溶酶原亲和力的物质是　t-PA
A.纤维蛋白
B.凝血酶
C.尿激酶型纤溶酶原激活物
D.激肽释放酶

思维导图·生理性止血

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：10-13 ABD A ABC A