随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

三、动脉血压

血压是指血管内流动的血液对血管侧壁产生的压力。若无特殊说明，血压一般指动脉血压，动脉血压一般指主动脉血压（其它动脉的血压可称为外周动脉压）《生理》一般不讨论外周动脉压 《内科》偶尔讨论外周动脉压


（一）基本概念

收缩压	一个心动周期中，因心室射血使**主动脉血压**达到的**最高**值	**快速射血期末**（收缩中期）双双 GC	理想值＜120mmHg 主狭杂音递增递减
舒张压	一个心动周期中，因心室停止射血使**主动脉血压**达到的**最低**值	**等容收缩期末**	理想值＜80mmHg
脉压	**收缩压-舒张压**		正常值 30-40mmHg
平均动脉压	一个心动周期每一瞬间动脉血压的平均值	**舒张压 + 1/3 脉压**	平均动脉压不是收缩压和舒张压的平均值，因为心动周期舒张期比例更大，因此**平均动脉压更接近舒张压**

（二）动脉血压的变化

①随年龄增长血压逐渐升高，且收缩压升高比舒张压升高更显著 年龄大了高血压,收缩压本来就比较高

②受**下丘脑视交叉上核**调节，血压存在昼夜波动的日节律（**双峰双谷**）昼夜交叉



上午 6-10 点、下午 4-8 点各有一个高峰

在这两个高峰对应时间是高血压发生脑卒中等并发症的高发期

平时监测血压、服用降压药应选择高峰为宜

（三）动脉血压的形成条件和影响因素

形成条件 4个	影响因素					
	影响因素	变化举例	**收缩压**	**舒张压**	**脉压**	主要影响
足够血液充盈 有血	平均充盈压	循环血量↓或循环系统容积↑（绝对相对的匹配）→平均充盈压↓→搏出量↓	↓↓	↓	↓	收缩压
心脏射血 射血	搏出量	↑	↑↑	↑	↑	收缩压
	心率	↑（**舒张期**缩短）	↑	↑↑	↓	舒张压
外周阻力 拦着	外周阻力	↑（阻力血管微、小动脉收缩或**细小动脉硬化**）②高血压	↑	↑↑	↓	舒张压
大动脉弹性储器 存着	大动脉弹性储器	↓①动脉粥样硬化(老男人好发)（**老年人大动脉硬化**）	↑	↓	↑↑	脉压

心输出量↑

避免收缩压过高,舒张压过低(缓冲)

《病理》大动脉硬化:动脉粥样硬化

细小动脉硬化:玻璃样变性