


局部代谢产物的含量调节毛细血管前括约肌和后微动脉的收缩、舒张

属于局部体液调节（局部调节），也可属于代谢性自身调节

（二）组织液的生成与回流




图 4-28　组织液生成与回流示意图

图中数值单位为 mmHg。

有效滤过压=

（毛细血管血压+组织液胶渗压）**动力**

-

（组织液静水压+血浆胶渗压）**阻力**




图 3-16　影响水分进出毛细血管的因素

正常毛细血管的流体静压和胶体渗透压平衡，通过毛细血管的液体量没有改变。当流体静压增加和胶体渗透压减低时，进入组织间隙的液体增加（水肿）。此时毛细淋巴管吸收过多的组织间液，如组织间液的量超越淋巴管引流的能力，则发生持续的组织水肿。

1.淋巴液 2-4L/d：回收蛋白质、运输脂类、调节体液平衡、防御免疫 2×4=8

2.**组织水肿（组织液↑）**

血管 **心衰** → 血压↑ → 组织液↑↑↑	淤血→血液淤积在小静脉和毛细血管→静脉和毛细血管的**血压/静水压↑**
肝病、肾病、营养不良 → 蛋白↓ → 血管 → 组织液	血浆蛋白↓→血浆**胶**渗压↓
血管 **过敏** / **炎症（如感染、烧伤）** → 蛋白质 → 组织液	毛细血管**通透性↑**→血浆蛋白进入组织液→血浆胶渗压↓、组织液胶渗压↑ 串：炎症是渗出液，药物过敏是漏出液
丹毒象皮肿、乳腺癌**橘皮样变**、**丝虫病** 癌细胞堵住淋巴管	**淋巴**回流受阻橡皮虫