随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.**舒张压大小**（冠脉开口于主动脉根部）

主A ⇉ 小微(阻力血管)收缩→外周阻力↑

外周阻力↑→主动脉向外周流血↓→留存在主动脉血↑→**舒张压↑→冠脉流量↑**

串：心绞痛不是冠心病的专利，任何使冠脉流量减少的情况都可发生心绞痛，如冠心病、主狭、**主闭（动脉舒张压↓）**、高血压、肥厚型心肌病、肺栓塞、X 综合征

主动脉不仅往外周流血还通过没有关全的主瓣膜向左心室返流,导致舒张期存在主动脉根部的血↓→舒张压↓→冠脉流量↓

3.**冠脉舒张程度**

（1）**交感神经、儿茶酚胺、甲状腺激素**（活化横桥数目↑　横桥ATP酶活性↑）**→心肌代谢、耗氧量↑→腺苷、H^+、CO_2、乳酸、缓激肽↑→冠脉舒张→冠脉流量↑**

需注意：冠脉主要受心肌代谢调节，虽然交感神经激动冠脉 α_1-R 使之收缩，但也激动心肌 β_1-R 使心肌代谢↑→腺苷等局部代谢产物↑ →冠脉舒张

冠脉主要受到局部代谢产物的调节,而不是神经调节

串：大失血时交感神经兴奋，可使全身多数血管收缩、但冠脉和脑血管却不收缩，因为冠脉主要受心肌局部代谢产物调节、而 $PaCO_2$↑和 PaO_2↓使脑血管舒张，称为**血量重新分配**，以保证心、脑重要器官的供血（主要受到氧分压和二氧化碳分压调节）

（2）**NO、降钙素基因相关肽 CGRP、肾上腺髓质素 ADM→冠脉舒张→冠脉流量↑**

串：硝酸酯类药抗心绞痛（在体内被代谢产生NO）

扩静脉	回心血量↓→前负荷↓→室壁张力↓、射血时间↓→心肌耗氧↓
扩动脉（次要）	后负荷↓→室壁张力↓→心肌耗氧↓
扩冠脉	冠脉流量↑→心肌供氧↑

β受体阻滞剂禁用于变异型心绞痛(冠脉自发的严重痉挛,此时要扩冠脉,用CCB)
硝酸酯禁用于右心室梗死

（3）**迷走神经、AngII、大剂量血管升压素 VP（抗利尿激素 ADH）、内皮素 ET→冠脉收缩→冠脉流量↓**。因此垂体后叶素禁用于冠心病

真题解析·微循环和冠脉循环

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N153 X 可使全身或局部组织液生成增多的有（发生组织水肿）


A.局部炎症 →血管通透性↑

B.代谢性酸中毒

C.I型过敏反应

D.右心衰竭

缺O2,酸中毒→心肌收缩力↓→搏出量↓(组织液生成的动力↓)



答案：1 ACD