
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

ttsx	心交感神经	心迷走神经
递质和受体	NA/NE→β_1-R	ACh→M-R
兴奋性 传导性 自律性 收缩性	四正效应 兴奋↑（去极化）、传导↑、心率↑、工作细胞收缩能力↑、心输出量↑	四负效应 兴奋性↓（超极化）、传导↓、心率↓、心房肌收缩能力↓、心输出量↓
分布	右侧交感神经主要支配窦房结→心率加快为主 左侧交感神经主要支配房室交界和心室肌→房室传导加快和心室肌收缩力增强为主	右侧迷走神经主要支配窦房结→心率减慢为主 左侧迷走神经主要支配房室交界→房室传导减慢为主（迷走神经对心室肌支配很少）

III类抗心律失常药如胺碘酮、四乙铵、E-4031 三甲医院

（三）E-4031 对自律性的影响

抑制窦房结 I_K→降低窦房结最大复极电位→影响 I_f 激活（I_f 复极化至-60mv 开始激活、超极化至-100mv 大量激活）→降低自律性



为什么与 ACh 的切入点不一样？

性感认识：窦房结 4 期自动去极化需要它下、下、下到一个点才能激活 I_f 弹回去：

ACh 让它下的太狠弹不回去了
IK-Ach
E-4031 让它下的不够弹不回去

酸中毒(抑制心肌收缩力)≠心衰

思维导图·心肌电活动和特性（含通道小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄