随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.血管内皮生成的**舒血管**物质

（1）**内皮超极化因子**（endothelium-derived hyperpolarizing factor,**EDHF**）

EDHF 促进 Ca^{2+}依赖的钾通道开放→K^+外流↑→血管平滑肌细胞超极化→舒张血管

不易爆发AP

白血病花钱

（2）**前列环素 PGI_2**（前体是花生四烯酸）可舒张血管、抗血小板、抗重构

需注意：PGI_2、PGE_2 舒张血管，而 $PGF_{2\alpha}$ 收缩血管　E→ 舒张　F← 收缩

（3）内皮舒张因子（**一氧化氮 NO**）

①**拮抗 RAAS 系统**：舒张血管（血管平滑肌细胞胞质 **Ca^{2+}↓**）、抗血小板、抗重构


乙酰胆碱　去甲肾上腺素

②**ACh**、**雌**激素、NA/NE、血流对内皮产生的切应力、缓激肽、硝酸甘油引起 NO 释放

收缩血管　ET　NO → 舒张血管

（已辞去、切鸡肝）

③**可溶性鸟苷酸环化酶受体** 一尿GC



sGC 是游离于胞质的**可溶性**鸟苷酸环化酶受体

Ca通道磷酸化→促进胞内Ca2+流出→舒张血管

（四）其它舒血管物质

1.**缓激肽**

