随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

对快速波动的血压进行经常性调节的心血管反射是
在血压过低时，为保证心、脑血供重新分配血量的心血管反射是

3. 2015N123-124 B
A.内皮素 还可能参与长期调节
B.血管升压素
C.血管紧张素
D.去甲肾上腺素
可作为交感神经递质或内分泌激素，可强烈提升动脉血压作用的活性物质是
一般不经常调节血压，仅在细胞外液明显减少时释放增多，起升压作用的体液因子是
血容量明显减少→ADH/VP剂量增大

4. 2016N123-124 B
A.血管紧张素I
B.血管紧张素II
C.血管紧张素III 三全凌汤圆
D.血管紧张素IV
在 RAS 中，促使全身微动脉收缩，升高血压作用最强的是
在 RAS 中，促进肾上腺皮质合成与释放醛固酮作用最强的是

5. 2017N139 X 促进肾素分泌的因素有 血容量↓→肾素↑
A.循环血量减少
B.肾小球滤过 Na^+减少
C.动脉血压降低
D.肾交感神经活动减弱 应兴奋交感

②肾素分泌的调节（用血容量去理顺、学成选择题）

肾动脉灌注压↓（血压/平均动脉压↓、血容量↓、长期低盐饮食）水跟着Na走	肾素↑（入球动脉牵张感受器）球旁C靠近入球动脉
小管液 Na^+↓（血浆 Na^+↓、肾小球滤过 Na^+↓）得到超滤液(除蛋白质其它跟血浆几乎一样)	肾素↑（远曲小管致密斑感受器）
交感神经兴奋	肾素↑（球旁细胞 β_1-R）
儿茶酚胺（去甲肾上腺素 NA/NE、肾上腺素 Adr）→肾素↑（β_1-R） 缓激肽、前列腺素 PG、小剂量多巴胺→肾素↑（儿茶酚胺还钱吧）	考研只有两个地方有：心肌C、肾小球球旁C
NO、钠尿肽如 ANP→肾素↓（鸟苷酸环化酶受体拮抗 RAAS） 内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 AngII→肾素↓（EVA）	

6. 2018N116-117 B
A.卡托普利
B.美托洛尔 β-R拮抗剂
C.维拉帕米 非二氢吡啶CCB
D.氯沙坦
属于血管紧张素II受体拮抗剂的是
属于血管紧张素转换酶抑制剂的是

7. 2019N4 A 关于血管紧张素II升高血压的机制，下列描述中错误的是
A.直接使全身微动脉收缩 调节血压
B.刺激肾上腺髓质激素分泌 皮
C.加强交感缩血管中枢的紧张性
D.促进交感神经末梢释放去甲肾上腺素
交感N和RAAS是好基友

3.肾上腺髓质激素（儿茶酚胺）的调节

	纯神经调节	体液调节(传出部分)
交感神经	应急：交感神经节前纤维释放 ACh→肾上腺髓质 N_1-R→儿茶酚胺	
ACTH 和糖皮质激素	儿茶酚胺参与应激	
自身调节（内在/胞内分泌）	儿茶酚胺释放入血→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑ 随时待命	X 酶 CA
代谢调节	低血糖促进儿茶酚胺分泌因而有交感神经兴奋症状 心跳加快(β1-R)。	

8. 2019N137 X 在一般情况下，小剂量静脉注射肾上腺素时可出现的心血管效应有
A.心率加快
B.肾血管舒张 也
C.心肌收缩力增强
D.骨骼肌血管舒张
心肌收缩能力增强

分布:大多数血管α1-R多→Adr→血管收缩
但骨骼肌血管、肝血管β2 -R多 冠脉也是β2-R多
剂量：小剂量Adr → β2-R → 舒张；大剂量Adr → α1-R → 收缩

答案:3-8 DB BC ABC DA B ACD