
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、用力肺活量 FVC

①用力吸气后再用力、并尽快呼气，所能呼出的最大气体量。用力呼气可致部分小气道提前关闭，因此**肺活量大于用力肺活量**

②将用力呼气量称为时间肺活量 FEV，在开始呼气前三秒内呼出的气体量分别为一、二、三秒用力呼气量（FEV_1、FEV_2、FEV_3）。时间肺活量更好的反映通气功能，是评价通气功能和效率的较好指标，**一秒率（FEV_1/FVC）是评价气流流速、鉴别阻塞性和限制性通气障碍的最常用指标**



三、阻塞性 VS 限制性通气障碍

	阻塞性通气障碍	**限制**性通气障碍
肺通气阻力	气道阻塞致**非弹性阻力过大**	**弹性阻力过大**致肺泡扩张受限
性感认识	**呼**气性呼吸困难 **流速↓**为主 牙膏孔小了	**吸**气性呼吸困难 **容积↓**为主 牙膏小了
常见疾病	**COPD/肺气肿、支气管哮喘**	“硬”**肺纤维化、胸膜病变**
肺功能	**FEV_1、FEV_1/FVC↓** FVC下降程度没有FEV1多 **FVC↓或正常** **RV、FRC↑**	FEV_1/FVC 基本不变 **TLC、FVC、FEV_1、RV、FRC↓** 《生理学》非比值指标均↓


生理学里可以把copd当成肺气肿


胸腔负压↓

eg.胸腔积液、气胸

比值指标基本不变

在生理学里直接背结论,内科学里再理解





肺纤维化：纤维-硬-紧身衣→肺泡扩张受限

四、肺通气量和肺泡通气量

1.肺通气量（每分通气量）：每分钟吸入或呼出的气体量

=潮气量×呼吸频率（正常呼吸频率 12-18 次/分）