
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



发绀：因为 Hb（去氧血红蛋白）紫蓝色、HbO_2 鲜红色、HbCO 樱桃色，所以发绀指血液 **Hb≥50g/L**（5g/100ml 血液）使皮肤黏膜呈紫蓝色

（发不发绀关注去氧血红蛋白 VS 缺不缺氧关注氧合血红蛋白）

①抓规律：一般发绀提示缺氧、缺氧会发绀

②记特殊：

发绀、但不缺氧	进入**高原**环境继发红细胞增多（氧解离曲线上段平坦）高原红
缺氧、但不发绀	**严重贫血、CO 中毒**（化妆别选樱桃色号）等

Hb<50　　HbCO(樱桃色)

小结：

CN⁻只影响细胞用氧
CO中毒既影响细胞用氧,又影响血红蛋白跟氧的结合和解离

ttsx	**动**脉血 P_aO_2	动脉血**氧含量**	**静**脉血 P_vO_2	皮肤黏膜
肺通气或换气障碍	↓	↓	↓	紫蓝
氧解离曲线左移 **CO 中毒**	正常	↓	↓	樱桃
严重贫血（氧解离曲线右移）	正常	↓ Hb↓ + O2→HbO2↓	↓	苍白（Hb 少了） 睑结膜苍白
氰化物中毒	正常	正常	↑	鲜红 CN⁻抑制氧化磷酸化→抑制细胞利用 O_2→静脉血 O_2 增多→HbO_2 比例高

