随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

D.碳酸酐酶在 CO_2 的运输中发挥着重要作用

8.2019N5 A CO_2 在肺部排出比率最高的血液运输形式为
A.物理溶解的 CO_2
B.氨基碳酰血浆蛋白
C.氨基甲酰血红蛋白 HbCO2
D.氨基甲酰血浆蛋白

9.2020N7 A 高原或高空中，若血液 PaO_2＞60mmHg，此时的 Hb 氧饱和度至少为
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%

10.2021N116-117 B
A.CO 中毒
B.PaO_2 下降 [说明肺换气或者肺通气障碍,缺氧状态 会促进氧合血红蛋白释放氧
C.$PaCO_2$ 升高
D.2,3-DPG 减少 左移→亲和力↑ →HbO2释放O2↓
不阻碍 Hb 结合 O_2，但阻碍 HbO_2 释放 O_2 的因素是
既阻碍 Hb 结合 O_2，又阻碍 HbO_2 释放 O_2 的因素是

11. 2023N138 X 关于血红蛋白的叙述，正确的有
A.R 型 Hb 分子对 O_2 的亲合力高于 T 型 Hb
B.H^+浓度升高时不利于 Hb 与 O_2 的结合 H^+↑ →右移→亲和力↓(波尔效应)
C.Hb 与 O_2 结合后呈樱桃红色
D.Hb 中的 Fe 主要为三价铁离子 二价铁

12.2024N7 A 下列各种情况下，可引起氧解离曲线右移的是
A.CO 中毒 左移
B.血 pH 升高 H^+↓
C.$PaCO_2$ 降低
D.红细胞糖酵解加强 2,3-DPG↑

思维导图·肺换气和气体运输

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:8-12 C D DA AB D