随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·口腔和食管的消化（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、唾液

1.**低渗**。唾液和汗液刚分泌时为等渗，但因醛固酮致最后排出来为低渗

打哑儿时难道咸咸的吗？不咸就是低渗吗？是的，不信你喝一口生理盐水（等渗，咸的）

2.成分：唾液淀粉酶（**最适 pH 6.6-7.1**）、**溶菌酶**、IgA 等

唾液基本接近中性，若是唾液很酸很碱、打哑儿时辣嘴巴啊

串：干燥综合征属于风湿系统疾病，其自身抗体 SSA、SSB 等破坏唾液腺→唾液分泌减少：

①口干（严重者进食固体食物需用水吞服）



②猖獗性龋齿（牙齿逐渐变黑继而小片脱落）

③并发胃食管反流病（食管清除作用降低不能靠唾液把反流物冲下去和稀释掉）

3.调节

抓规律	记特殊
多数消化液既受神经、又受体液调节	唾液几乎**仅受神经**调节 pure 全兴奋（**胃泌素对唾液分泌无影响**）
交感和副交感神经的作用多为拮抗 （交感对心脏四正、副交感对心脏四负效应 交感使支气管舒张、副交感使支气管收缩）	交感和副交感神经都**促进唾液**分泌 打哑儿时交感神经兴奋，有唾液、 但不至于量太大哇、而且拉丝

①**副**交感神经→**量多**固体少的**稀薄**唾液↑（**唾液分泌最依赖副交感神经**）

递质共存：副交感神经内含乙酰胆碱（唾液分泌+舒张血管）和血管活性肠肽（舒张血管）

多种递质可以在一个囊泡中

②**交感**神经→**量少**固体多的**黏稠**唾液↑

局部血流量多 → 唾液量多

递质共存：交感神经内含去甲肾上腺素（唾液分泌+收缩血管）和神经肽 Y（收缩血管）




图 10-12　支配唾液腺的自主神经中递质共存的模式图
NE，去甲肾上腺素；NPY，神经肽 Y；ACh，乙酰胆碱；VIP，血管活性肠肽。