
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

真题解析·胃内消化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N11 A 迷走神经节后纤维兴奋引起胃幽门部胃泌素分泌的神经递质是


A.三磷酸腺苷
B.蛙皮素
C.乙酰胆碱
D.一氧化氮



2. 2015N11 A 以下选项中，进食引起胃容受性舒张的支配神经是

A.迷走神经肽能纤维
B.迷走神经胆碱能纤维
C.交感神经胆碱能纤维
D.交感神经肾上腺素能纤维


迷走神经肽能纤维	食物经过食管时 LES 舒张：VIP+NO 胃容受性舒张：VIP+NO 促进 G 细胞释放胃泌素：胃泌素释放肽/GRP/铃蟾素/蛙皮素



3. 2016N12 A 在胃黏膜壁细胞完全缺乏时，患者不会出现的情况是

A.维生素 B_{12} 吸收障碍
B.食物蛋白质消化不良
C.胰腺分泌 HCO_3^- 减少
D.肠道内细菌加速生长


会影响，但是蛋白主要靠胰蛋白酶消化
最强
←促胰液素←HCl←壁细胞



HCl是促胰液素的最强刺激物，所以HCl缺乏→促胰液素↓→胰液分泌↓

4. 2018N7 A 促胃液素延缓胃排空的原因是

A.增强肠-胃反射
B.增强幽门括约肌收缩
C.抑制壁内神经丛反射
D.抑制迷走-迷走反射



5. 2020N8 A 决定胃酸最大分泌量的主要因素是

A.质子泵的活性
B.壁细胞的数量
C.碳酸酐酶的活性
D.迷走神经的活动度

6. 2020N139 X 人在进食后可增强胃排空的因素有

A.促胃液素
B.肠-胃反射
C.迷走-迷走反射
D.壁内神经丛反射

迷走-迷走长反射 和 壁内在神经丛短反射	促进胃排空（机械性消化） 促进胃期胃液分泌（化学性消化） 促进胃容受性舒张（特征运动）

7. 2022N138 X 胃的运动形式有

A.紧张性收缩
B.蠕动
C.分节运动