
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·肠内吸收（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、吸收部位



1.小肠是吸收的主要部位

①多数食物在小肠已被分解为小分子物质（胰酶）

②食物在小肠停留时间长

③小肠黏膜绒毛有丰富的毛细血管和淋巴管


④小肠的三级放大结构使其表面积巨大

小肠上部是消化吸收的主要部位

串：高位小肠瘘、短肠综合征等需肠外营养

肠子很短不利于消化吸收

（不经过胃肠道、把营养液直接输入静脉）



2.小肠的吸收部位和方式

	抓规律	记特殊
吸收部位	**小肠上部（十二指肠、空肠上段）**	**回肠：$VitB_{12}$（需内因子）、胆盐/胆汁酸盐** 延毕回家
吸收方式	血液 血管 2 个字——中短链 淋巴管 3 个字——长链	**淋巴液：VitA、D、E、K 和脂类消化产物（除开中短链脂肪酸）**　脂类:脂肪、胆固醇、磷脂 因食物长链脂肪酸多，因此脂类吸收以淋巴液为主 （淋巴液：回收蛋白质、运输脂类、调节体液平衡、防御免疫）

二、水溶性维生素的吸收

1.多数水溶性维生素：依赖 Na^+ 的同向转运体

低密度脂蛋白

2.**$VitB_{12}$：受体介导入胞**（受体介导入胞转运 LDL、运铁蛋白、维生素 B_{12} 转运蛋白）地铁12号线

胃	$VitB_{12}$ 与 **R 蛋白**结合（主要）
	$VitB_{12}$ 与内因子结合（内因子与 $VitB_{12}$ 的亲合力比 R 蛋白小）
肠	$VitB_{12}$ 与内因子结合（胰蛋白酶将 $VitB_{12}$ 与 R 蛋白分开）
内因子缺乏、胃酸缺乏、或胰蛋白酶缺乏等均可致 **$VitB_{12}$ 缺乏** （需注意：胃酸缺乏不能等同于胃酸减少，如慢性萎缩性胃炎中的 A 型胃炎胃酸缺乏、而 B 型胃炎胃酸正常或减少）少量胃酸就可以给VitB12解除束缚	

不会合并巨幼贫

A型胃炎

