
四、单糖和氨基酸（或寡肽）的吸收



①二、三肽等寡肽为 H^+-继发性主动转运，且比氨基酸吸收更快（寡人爱卿更快）

②氨基酸的吸收速度：中性＞碱性＞酸性（中间酸）

③单糖的吸收速度：己糖（半乳糖和葡萄糖＞果糖＞甘露糖半个葡萄果然甘甜）＞戊糖如核糖

五、铁和钙的吸收

	铁的吸收	钙的吸收
促进吸收	①需求量：服用相同剂量的铁、缺铁患者比正常人铁的吸收量高 ②HCl（溶解）：胃大部切除术、A型胃炎等也可致缺铁贫 ③VitC（还原）：将 Fe^{3+}（食物以三价铁为主）还原为 Fe^{2+}	①需求量 ②HCl（溶解） ③VitD（最重要） ④乳酸、葡萄糖、脂肪酸、氨基酸牛奶里都有（孩子要补钙锁定蓝瓶钙、蓝瓶钙好喝的钙、葡萄糖酸钙口服溶液、哈药六厂…） 需注意：肠腔的脂肪酸与 Ca^{2+} 形成钙皂→利于 Ca^{2+} 在肠道吸收（把钙抓住别让它跑）；而急性重症胰腺炎脂肪坏死→脂肪酸与血液的 Ca^{2+} 形成钙皂→低钙血症 在血液里形成钙皂
抑制吸收	谷类、乳类、茶（谷乳茶） 《外科》：磷酸钙结石、草酸钙结石	草酸、磷酸、植酸（少吃菠菜、多喝牛奶）（吃菠菜前要 chāo 几道水、否则它们与钙形成沉淀，估计大力水手的肌肉都是沉淀）
其它	吸收（2价）→运输（3价）→利用（2价）→储存（3价） xi yun li chu	食物的钙多数随粪便排出

肠腔：脂肪酸 + Ca^{2+} ↓ 钙皂

胃大部切除术、A型胃炎破坏了壁细胞
- 内因子↓→巨幼贫
- HCl↓→缺铁贫

↓

此时更容易发生巨幼贫，因为体内的铁主要来源于衰老红细胞，并非体外吸收
缺铁贫更主要的原因是慢性失血而非盐酸缺乏