随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

②若**有效滤过压↓**，即有效滤过压降低到 0 的时间提前→滤过平衡点向入球动脉端移动→有效滤过**面积↓**→**GFR↓**；若有效滤过压↑，即有效滤过压降低到 0 的时间延后→滤过平衡点向出球动脉端移动→有效滤过面积↑→GFR↑






图 8-7　肾小球毛细血管血压、血浆胶体渗透压和囊内压对肾小球有效滤过压的影响



有效滤过压＝
肾小球毛细血管血压(直接动力)-(肾小囊囊内压＋血浆胶渗压)

（2）有效滤过压的影响因素（公式）

激动α1-R　进来的水少了　保证血流重新分配

肾小球毛细血管血压 原尿生成的直接动力	①**剧烈运动、应急**等→**交感神经**→入球动脉收缩→**毛细血管血压↓**→**有效滤过压↓**→**GFR↓** 有效滤过压降到0的时间提前,有效滤过面积↓ ②缓进型**高血压**→入球动脉玻璃样变性（**动脉硬化**）致狭窄→毛细血管血压↓→有效滤过压↓→GFR↓ 主要累及细小动脉 VS动脉粥样硬化主要累及大中动脉
肾小囊囊内压 尿路梗阻	**尿路结石、肿瘤压迫、蛋白管型等梗阻**→**囊内压↑**→**有效滤过压↓**→GFR↓  囊内压急剧增加,肾小球滤过率急剧下降,早期肾衰竭 （新月体性肾炎：肾小囊壁层上皮细胞增生闭月）
肾小球毛细血管血浆**胶**渗压 （胶渗压维持血管内外水平衡） VS	**大量输液**（稀释）、**肝功能受损**（白蛋白合成减少）、肾小球毛细血管**通透性增大**（血浆蛋白从尿中丢失）→血浆白蛋白↓→肾小球毛细血管**血浆胶渗压↓**→**有效滤过压↑**→GFR↑ 但临床：肝硬化低蛋白血症→组织液生成增多→组织水肿、腹水→有效循环血量↓→GFR↓（肝肾综合征）

晶体渗透压维持细胞内外水平衡　肝功能受损在生理学里面只是实验性局部考虑,不是从全身考虑,在临床上肝硬化患者的整体情况是GFR下降

三、肾小球滤过的影响因素

（一）有效滤过压