（5）**ADH 释放的影响因素**


酒　心房钠尿肽 拮抗RAAS

①使 ADH 释放↓：**乙醇**（喝通了）、**ANP**、**咖啡因**、**糖皮质激素等**酒心咖啡糖

②使 ADH 释放↑：**血浆晶渗压↑（最重要）**、**血容量↓**、动脉血压↓、Ang、应激、创伤、疼痛、恶心等

Na+↑需要水↑

血容量↑→心肺容量感受器→ANP↑、醛固酮↓、ADH↓(抑制)






图 11-11　血管升压素的生理作用及其分泌调节示意图

丢失低渗液体　　大量出汗尿量减少是体液调节

大量出汗、高热、严重呕吐腹泻	**血浆晶渗压↑→ADH↑**→尿量↓、尿比重↑
饮大量清水（水利尿）检测肾的稀释能力	**血浆晶渗压↓→ADH↓**→尿量↑、尿比重↓

尿中渗透压




图 8-16　水利尿示意图

一次饮 1L 清水（实线）和 1L 等渗盐水（0.85% NaCl 溶液）（虚线）后的排尿率，箭头表示饮水时间。

调节尿量的关键是集合管，此时不考虑GFR

饮 1000ml 清水后 1 小时尿量可达最高峰

饮 1000ml 生理盐水尿量不出现饮清水那样的变化