2.小管液渗透压的变化（渗透压与血浆渗透压作比较）

	重吸收水	重吸收 NaCl	尿素	小管液渗透压变化
髓袢降支细段	√ 降水	×	中等√（入小管）	显著浓缩↑↑ 高渗（髓袢折返处 max）
髓袢升支细段	×	√（顺浓度被动）	×	开始稀释↓
髓袢升支粗段	×	√（Na^+-K^+-$2Cl^-$）	×	显著稀释↓↓稀释能力最强（末端：低渗）
远曲小管	×	√（Na^+-Cl^-）	×	继续稀释↓（低渗）
集合管皮质和外髓	√（ADH）	√（ENaC）	×	进入集合管的小管液呈低渗，但根据水盐平衡、ADH 调节集合管对水的通透性→终尿可呈低、等、高渗（集合管内髓部渗透压变化最大）
集合管内髓	√（ADH）	√（ENaC）	高度√（出小管，ADH）	

结构决定功能，髓袢升支粗段存在很多线粒体（细胞就不会小）→产生ATP给钠钾泵

需注意 ttsx：集合管为调节终尿浓缩和稀释的关键部位，若 ADH↓→集合管对水通透性↓→水重吸收↓→远曲小管的低渗小管液得不到浓缩→终尿被稀释

（小管液流经近曲小管、髓袢、远曲小管渗透压变化基本固定，

但终尿渗透压会随机体水钠等情况可发生较大幅度变化）

