随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

D.髓袢升支粗段


8. 2016N17 A 机体在安静状态下，对醛固酮分泌调节不起作用的因素是
A.高血 Na^+ 抑制醛固酮的分泌
B.高血 K^+
C.促肾上腺皮质激素 安静状态下/生理状态下只会促进糖皮质激素
D.血管紧张素II 应激情况下才促进醛固酮释放

9. 2017N10 A 正常人摄入钾增多时，肾脏排钾也随之增多的原因是
A.远曲小管和集合管分泌钾离子增多 泌钾主要在集合管主细胞
B.近球小管重吸收钾离子减少
C.醛固酮分泌减少
D.肾小球滤过率增强

10. 2017N11 A 在尿液的浓缩、稀释调控中，起到关键作用的体液因子是
A.血管紧张素II 肾髓质组织间液形成高渗透梯度NaCl/NaCl、尿素
B.血管升压素 维持肾髓质高渗 u型直小血管
C.醛固酮 通透性 AQP-2(ADH)
D.心房钠尿肽

11. 2018N11 A 在肾远曲小管和集合管上皮细胞内，不属于醛固酮诱导蛋白的物质是
A.基底侧膜上的钠泵 线粒体ATP合酶为基底膜的钠钾泵提供ATP,钠钾泵提供钠离子势能,通过
B.管腔膜上的钠通道 ENaC钠离子顺浓度内流保钠
C.管腔膜上的水孔蛋白 保水是继发于保钠
D.线粒体中合成 ATP 的酶

12. 2019N10 A 对 NaCl 不易通透而对水易通透的肾小管段为
A.髓袢降支细段 近端等渗
B.髓袢升支细段 降细浓缩
C.髓袢升支粗段 升段稀释
D.远曲小管



13. 2019N140 X 肾脏对尿液进行浓缩所需要的条件有
A.肾髓质间质高渗 肾髓质组织间液形成高渗透梯度NaCl/NaCl、尿素(动力)
B.肾交感神经兴奋 维持肾髓质高渗 u型直小血管
C.血管升压素的释放 通透性 AQP-2(ADH)
D.小管液中高溶质浓度
渗透性利尿破坏了水重吸收的动力,小管液中高溶质浓度会导致小管内外渗透差减小
水利尿→血浆晶体渗透压↓→ADH↓→水重吸收的通透性↓(AQP-2↓)

14. 2020N12 A 能刺激近球细胞分泌肾素的体液调控分子是
A.内皮素
B.肾上腺素
C.血管升压素
D.血管紧张素II

（1）肾素释放的影响因素（用血容量去理顺、多次重复）

肾动脉灌注压↓ （血压/平均动脉压↓、血容量↓、长期低盐饮食）	肾素↑（入球动脉牵张感受器）
小管液 Na^+↓（血浆 Na^+↓、肾小球滤过 Na^+↓）	肾素↑（远曲小管致密斑感受器）
交感神经兴奋	肾素↑（球旁细胞 β_1-R）
儿茶酚胺（去甲肾上腺素 NA/NE、肾上腺素 Adr）→肾素↑（β_1-R） 缓激肽、前列腺素 PG、小剂量多巴胺→肾素↑儿茶酚胺还钱吧	
NO、钠尿肽如 ANP→肾素↓（乌苷酸环化酶受体拮抗 RAAS） 内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 AngII→肾素↓EVA	

答案:8-14 C A B C A AC B