

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



感性认识:光照的时候由视锥细胞感光,此时瞳孔刚好是缩小的
弱光一瞳孔开大一暴路出更多视杆细胞,视杆细胞感受弱光






图 9-23　暗适应曲线

四、视觉相关现象

（一）明适应 VS 暗适应

	明适应	暗适应
概念	从暗处进入明处	从明处进入暗处
本质	视锥细胞恢复活动	视杆细胞恢复活动
适应速度	快（分解快）	慢（合成慢）
第一阶段看不清	视杆细胞在暗处蓄积的大量视紫红质进入明处迅速分解（耀眼感）	明处视紫红质大量分解 对光的反应速度更快
第二阶段才看清	视杆细胞的视紫红质大量分解后，对光相对不敏感的视锥细胞的视色素可继续感受光刺激	视锥细胞合成视色素使感知光线的阈值↓ 视杆细胞合成视色素使感知光线的阈值↓（主要）

从很亮的地方突然进入暗处
一开始看不清楚
要过段时间才能看清楚

视杆细胞(对光敏感度更高)在暗处积累了大量视紫红质,压着视锥细胞不让视锥细胞感光

视锥细胞在暗处看不清(光敏度低)
只有等视杆细胞合成一定量的视紫红质才能感光(合成很慢)